

**薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への
副作用・感染症等報告について**

平成16年4月1日から平成16年7月31日までの報告受付分

1. 製造業者等からの医薬品等の副作用・感染症等報告(第77条の4の2第1項)

(1) 国内症例の報告状況

	副作用報告	感染症報告	
医療用医薬品報告件数(件)	8,868	76	(資料No.2-2)(資料No.2-4)
一般用医薬品報告件数(件)	116	-	(資料No.2-3)
合計	8,984	76	

(2) 外国症例の報告状況

	副作用報告	感染症報告
報告件数(件)	17,819	43

(3) 外国での新たな措置の報告状況

報告件数(件)	129	(資料No.2-5)
---------	-----	------------

(4) 研究報告の報告状況

報告件数(件)	456	(資料No.2-6)
---------	-----	------------

2. 医薬関係者からの医薬品の副作用・感染症報告(第77条の4の2第2項)

報告件数(件)	1,577
---------	-------

副作用・感染症報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用・感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造業者等及び医薬関係者から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用・感染症報告の件数については、平成16年4月1日～平成16年7月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用・感染症報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、追加情報により因果関係が否定され、本報告期間中に報告を取り下げた場合、件数から除外されている。
- 4) 外国情報及び医薬関係者からの報告の件数は、医療用医薬品と一般用医薬品の合計数である。
- 5) 資料No.2-2、2-3の報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 6) 資料No.2-2、2-3の副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。
- 7) 資料No. 2-4の感染症報告については、報告症例ごとに、被疑薬及び感染症名を記載している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成16年4月1日～平成16年7月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静薬	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	ジスキネジー 横紋筋融解 振戦	1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	視覚障害 食欲不振 中毒性表皮壊死融解症 薬疹 薬物依存	1 1 1 1
解熱鎮痛薬	1錠中アセトアミノフェン33mg	血小板数減少 紫斑 白血球数減少	1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝障害 腹痛 薬剤離脱症候群	1 1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, トラネキサム酸140mg, 無水カフェイン80mg	意識消失	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg	中毒性表皮壊死融解症 粘膜浮腫	1 1
解熱鎮痛薬	4錠中エテンザミド1g, アセトアミノフェン600mg, 無水カフェイン140mg, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg	中毒性表皮壊死融解症	1
解熱鎮痛薬	2錠中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド400mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	そう痒症 潮紅	1 1
解熱鎮痛薬	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	多形紅斑	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック 白血球破碎性血管炎	1 1
解熱鎮痛薬	4錠中アスピリン1.32g, 炭酸マグネシウム400mg, ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩200mg	間質性肺疾患	1
解熱鎮痛薬	3錠中アセトアミノフェン900mg	肺臓炎	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン0.5g	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウイ8g	肝障害 間質性肺疾患	1 1
かぜ薬(内用)	3包中アセトアミノフェン675mg, クエン酸ペントキシベリン48mg, 塩酸イソチペンジル7mg, アスコルビン酸ナトリウム500mg, 無水カフェイン90mg, マオウ乾燥エキス400mg, カンゾウエキス末357.14mg, ショウキョウエキス末150mg	中毒性皮疹	1
かぜ薬(内用)	1包(1.5g)中アセトアミノフェン300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, 無水カフェイン25mg, カミツレエキス111.1mg, ニンジンエキス14.3mg, カンゾウエキス150mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	3包中トラネキサム酸750mg, アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム150mg, 無水カフェイン75mg	上腹部痛	1
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(加倍), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェニン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ピスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患 上腹部痛 薬剤離脱症候群	1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
		薬物依存 嘔吐	1 1
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	腎尿細管壊死	1
かぜ薬(内用)	3包(4.5g)中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, 無水カフェイン150mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 小青竜湯エキス1.335g(小青竜湯8.01g)	肝機能異常 薬疹	1 2
かぜ薬(内用)	3包中葛根湯乾燥エキス850mg, アセトアミノフェン715mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン60mg, ノスカピン48mg, グアヤコールスルホン酸カリウム200mg, 無水カフェイン150mg	肝障害	1
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
かぜ薬(内用)	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルファード24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	横紋筋融解 黄疸 肝障害 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少	1 1 1 1 1
かぜ薬(内用)	9錠中アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン15mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, ビタミンB2 12mg, ビタミンC500mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬(内用)	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	1
かぜ薬(内用)	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	薬疹	1
かぜ薬(内用)	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック 間質性腎炎 間質性肺疾患	1 1 1
かぜ薬(内用)	3錠中イブプロフェン150mg, 塩酸プロムヘキシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	四肢痛	1
かぜ薬(内用)	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	薬疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬(内用)	9錠中フル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	肝障害 劇症肝炎 肺炎	1 1 1
かぜ薬(内用)	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシベリン16mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	9錠中d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, エテンザミド900mg, アセトアミノフェン360mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, カンゾウエキス末72mg(カンゾウ504mg), オウヒエキス80mg(オウヒ2g), 無水カフェイン150mg	肝機能異常	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペビシン75mg, , dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	胸水 肺水腫	1 1
かぜ薬(内用)	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジゾ酸クロペラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロテナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン720mg, カッコン湯乾燥エキス834mg(葛根湯5g), ノスカピン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 合成ケイ酸アルミニウム600mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アスピリン750mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, アスコルビン酸120mg, セミアルカリプロテナーゼ30mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン660mg, エテンザミド400mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン9mg, ヘスペリジン40mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペビシン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 胆汁うつ滞	1 1 1
かぜ薬(内用)	60mL中アセトアミノフェン300mg, 塩酸ジフェンヒドラミン25mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 柴胡桂枝湯エキス300mg(柴胡桂枝湯3g)	血小板減少症	1
その他の精神神経用薬	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	ほてり 顔面浮腫 第6脳神経麻痺 頭痛	1 1 1 1
一般点眼薬	1mL中プロノプロフェン0.5mg	角膜びらん 虹彩炎	1 1
抗菌性点眼薬	1mL中スルファメトキサゾール40mg, グリチルリチン酸二カリウム1mg	視力低下 緑内障	1 1
鼻炎用内服薬	1包(1g)中ベラドリン20.67mg, グリチルリチン酸46.7mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 塩酸プロソイドエフェドリン60mg, 無水カフェイン25mg	アレルギー性胞隔炎	1
鼻炎用内服薬	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフリン3mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン34mg, ダツラエキス12mg	くも膜下出血 肝機能検査値異常 血中アミラーゼ 血中クレアチニンホスホキナーゼ	2 1 1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
		呼吸不全 脳出血 不整脈	1 1 1
鼻炎用内服薬	2カプセル中塩酸フェニルプロパノールアミン90mg, 無水カフェイン100mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg	胃腸出血 脳梗塞 脳出血 播種性血管内凝固	1 1 1 1
鼻炎用内服薬	2カプセル中ヨウ化イソプロパミド5.092mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, 塩酸ジフェニルピラリン7.5mg, 無水カフェイン100mg	心筋症	1
鼻炎用内服薬	2カプセル中マレイン酸カルビノキサミン12mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン80mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩化リゾチム30mg(力価), 無水カフェイン120mg	不安定狭心症 薬物依存	1 1
鼻炎用内服薬	3カプセル中塩酸ジフェニルピラリン12mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, グリチルリチン酸二カリウム60mg, カフェイン75mg	浮動性めまい	1
鼻炎用内服薬	3カプセル中マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, カフェイン120mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
鼻炎用点鼻薬	100mL中塩酸テトラヒドロゾリン0.1g, マレイン酸クロルフェニラミン0.5g, 塩化ベンゼトニウム20mg	閃輝暗点	1
動脈硬化用薬	6カプセル中80%パンテチン水溶液375mg(パンテチン300mg), ソイステロール600mg, 酢酸d-α-トコフェロール100mg	感覚減退 背部痛	1 1
鎮咳去痰薬	1包(1g)中塩酸メトキシフェナミン50mg, ノスカピン20mg, カンゾウエキス末66mg(カンゾウ330mg), グアヤコールスルホン酸カリウム90mg, 無水カフェイン50mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg	嗄声	1
鎮咳去痰薬	3包(36錠)中リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン9mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg	急性全身性発疹性膿疱症	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	9錠中有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg, タカヂアスターN1135mg, ビオチン18μg	肝障害 多形紅斑	1 1
ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	1錠中ファモチジン10mg	肝障害 急性肝炎	1 1
瀉下薬	1錠中ビサコジル5mg	尿路結石	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	3包(3.6g)中ヒドロタルサイト1.5g, アルジオキサ90mg, ウルソデオキシコール酸30mg, ビオヂアスターN1120mg, カンゾウ末150mg, ロートエキス3倍散90mg, ウイキョウ末90mg, ケイヒ末150mg, ショウキョウ末90mg	失神	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	4錠中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 苟薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	肝機能異常 肝障害	1 1
その他の泌尿生殖器官及び肛門薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	尿閉	1
殺菌消毒薬	0.3mL中ヨードホルム1.1g	記憶障害 失見当識 不安	1 1 1
殺菌消毒薬	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファザリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75mg	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100mL中サリメント2.5g, l-メントール3g, マレイン酸クロルフェニラミン100mg, ニコチン酸ベンジル10mg, ノニル酸ワニルアミド12mg	胃炎	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100g(1,000cm ²)中サリチル酸グリコール2g, 酢酸トコフェロール0.3g, トウガラシエキス0.02g(伸縮性)	接触性皮膚炎 皮膚炎	1 1
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100g中サリチル酸メチル6.29g, l-メントール5.71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1.24g(1枚6.5×4.2cm ²)	皮膚色素脱失	1
みずむし・たむし用薬	1mL中塩酸ブテナфин10mg	接触性皮膚炎	1
みずむし・たむし用薬	100mL中トルナフタート2g, 塩酸ジフェンヒドラミン0.51g, グリチルレチン酸0.2g	角膜損傷	1
みずむし・たむし用薬	15mL中木槿皮チンキ6mL, 安息香酸1.8g, サリチル酸0.9g	蕁麻疹	1
みずむし・たむし用薬	1mg中塩酸ブテナфин10mg	リンパ腺感染 皮膚感染	1 1
毛髪用薬	100mL中ミノキシジル1g	アレルギー性肉芽腫性血管炎 狭心症 血中クレアチニンホスホキナーゼ増加 発疹	1 1 1 2
毛髪用薬	100mL中塩化カルプロニウム水和物1.09g(塩化カルプロニウム1g), カシュウチンキ3mL(カシュウ1g), チクセツニンジンチンキ3mL(チクセツニンジン1g), パントニールエチルエーテル1g, l-メントール0.3g, ヒノキチオール0.05g	湿疹	1
ビタミンE主薬 製剤	3錠中メコバラミン1500μg, 葉酸5mg, 酢酸d-α-トコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	眼の充血 血圧低下 呼吸困難 霧視	1 1 1 1
ビタミンB1主薬 製剤	3錠中塩酸フルスルチアミン109.16mg, 塩酸ピリドキシン100mg, シアノコバラミン1.5mg, コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg, ガンマ-オリザノール10mg, パントテン酸カルシウム30mg	恶心 下痢 口渴 食欲不振 頭痛 発熱 嘔吐	1 1 1 1 1 1
カルシウム主薬 製剤	3錠中ボレイ末2.014g	下痢	1
生薬主薬製剤	1g中ローヤルゼリー100mg	口内炎	1
ビタミン含有保健薬	1本(50mL)中ケエン酸鉄アンモニウム18mg, リン酸リボフラビンナトリウム15mg, 塩酸ピリドキシン25mg, ヨクイニン流エキス1mL(ヨクイニン1g), ニコチン酸アミド40mg, アミノエチルスルホン酸500mg	胆汁うっ滯性肝炎	1
ビタミン含有保健薬	3瓶(150mL)中カンゾウエキス1.05g, オロチニ酸コリン174mg, アミノエチルスルホン酸900mg, 塩酸ピリドキシン15mg, パンテノール60mg	高血圧 動悸 腹部不快感	1 1 1
抗ヒスタミン薬 主薬製剤	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg, 塩酸ピリドキシン2.5mg, グリチルリチン酸カリウム20mg, グルコン酸カルシウム150mg	急性肝炎	1
漢方製剤	3包(4.5g)中葛根湯エキス末M3.9g(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)	咽頭不快感 体位性めまい 動悸 浮動性めまい 嘔吐	1 1 1 1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
漢方製剤	12錠中釣藤散料エキス末1.8g(チョウトウコウ・チンピ・バクモンドウ・ハンゲ・ブクリョウ各1.5g, ボウフウ・キクカ・ニンジン各1g, セツコウ2.5g, ショウキョウ・カンゾウ各0.5g)	肝機能異常	1
漢方製剤	3本(90mL)中葛根湯水製抽出液90mL(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
漢方製剤	3瓶(90mL)中葛根湯抽出液A 60mL(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)	中毒性表皮壊死融解症	1
漢方製剤	3包(5.4g)中清心蓮子飲乾燥エキス4.06g(レンニク・ニンジン各3.5g, バクモンドウ・シャゼンシ・オウゴン・ジコッピ各2.1g, ブクリョウ・オウギ各2.8g, カンゾウ0.7g)	尿閉 尿路感染 両側水腎症	1 1 1
漢方製剤	1錠中大黃甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg)	好酸球性肺炎	1
殺虫薬	フェノトリン0.4%	甲状腺機能低下症	1
禁煙補助剤	1個中ニコチン2mg	呼吸困難	1