

カズサホス (案)


1. 品目名：カズサホス (cadusafos)

2. 用途：殺線虫剤

有機リン系殺虫剤である。作用機序は、アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することにより殺虫活性を示す。

3. 化学名：S,S-ジ-*sec*-ブチル=O-エチル=ホスホロジチオアート
S,S-di-*sec*-butyl O-ethyl phosphorodithioate (IUPAC)

4. 構造式及び物性



分子式 $\text{C}_{10}\text{H}_{23}\text{PS}_2\text{O}_2$
 分子量 270.04
 水溶解度 241 mg/L (20°C)
 分配係数 $\log P_{ow} = 4.08$ (20°C)

(メーカー提出資料より)

5. 適用病害虫の範囲及び使用方法

○ 3% マイクロカプセル剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カズサホスを含む農薬の総使用回数
だいこん	キジノミムシ	20~30kg/10a	播種前	1回	全面処理	1回
	ネコブセンチュウ	20kg/10a			土壌混和	
	ネコブセンチュウ	20~30kg/10a				

きゅうり すいか メロン トマト なす	ネコフセンチュウ	20~30kg/10a	定植時	1回	全面処理 土壌混和	1回
にんにく	任ネコフセンチュウ	30kg/10a	植付前			
さといも	ネコフセンチュウ	20~30kg/10a				
かんしょ	ハリカネムシ	30kg/10a				
	ネコフセンチュウ コガネムシ類	20~30kg/10a				
	コガネムシ類	9kg/10a			作条処理 土壌混和	
きく	ネコフセンチュウ	20kg/10a	定植前		全面処理 土壌混和	
キャベツ レタス	ネコフセンチュウ		播種前			
ほうれん そう	ネコフセンチュウ		定植前			
いちご	ネコフセンチュウ		定植前			

下線部分 () は平成 16 年 5 月 13 日付け適用拡大申請中の内容

6. 作物残留試験結果

(1) 分析の概要

① 分析対象の化合物

- ・ カズサホス

② 分析法の概要

試料をアセトンで抽出してアセトンを留去した後、C18 ミニカラム及びフロリジルミニカラムにより精製し、ガスクロマトグラフィーを用いて定量する。

(2) 作物残留試験結果

① きゅうり

施設栽培のきゅうり（果実）を用いた作物残留試験(2例)において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和(30kg/10a)したところ、施用後35~49、38~52日の最大残留量は、それぞれ0.006、0.012 ppmであった。

② すいか

施設栽培のすいか（果実）を用いた作物残留試験(2例)において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和(30kg/10a)したところ、施用後95~102日の最大残留量

は、0.002, <0.001 ppmであった。

③だいこん（根部）

露地栽培のだいこん（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後57～71、64～78日の最大残留量は、それぞれ0.010, 0.007 ppmであった。

④だいこん（葉部）

露地栽培のだいこん（葉部）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後15～71、13～78日の最大残留量は、それぞれ0.010, 0.004 ppmであった。なお、施用後13, 15, 18, 22日における試験は、つまみ菜、間引き菜としての利用を想定している。

⑤かんしょ

露地栽培のかんしょ（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後120～134、109～123日の最大残留量は、それぞれ0.004, 0.002 ppmであった。

⑥トマト

施設栽培のトマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後49～63、53～67日の最大残留量は、それぞれ<0.001, 0.001 ppmであった。

⑦メロン

施設栽培のメロン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後76～90、89～103日の最大残留量は、それぞれ0.003, 0.004 ppmであった。

⑧にんにく

露地栽培のにんにく（鱗茎）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後249～263、215～229日の最大残留量は、それぞれ<0.005, <0.005 ppmであった。

⑨なす

施設栽培のなす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後37～51、59～73日の最大残留量は、それぞれ<0.005, <0.005 ppmであった。

⑩さといも

露地栽培のさといも（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（30kg/10a）したところ、施用後135～149、159～173日の最大残留量は、それぞれ0.008, 0.007 ppmであった。

⑪キャベツ

施設栽培のキャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（4例）において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和（20kg/10a）したところ、施用後61～75、75～89日、102～116日、64～78日の最大残留量は、いずれも<0.001 ppmであった。

⑫レタス

施設栽培のレタス（茎葉）を用いた作物残留試験（4例）において、3%マイクロカ

プセル剤を1回土壌混和(20kg/10a)したところ、施用後55~69、43~57日、49~63日、64~78日の最大残留量は、それぞれ<0.001, 0.002, 0.005, <0.001 ppmであった。

⑬ほうれんそう

施設栽培のほうれんそう(茎葉)を用いた作物残留試験(6例)において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和(20kg/10a)したところ、施用後47~61、35~49日、33~47日、36~50日、39~53日、41~55日の最大残留量は、それぞれ0.005, 0.004, 0.003, 0.004, 0.026, 0.008 ppmであった。

⑭いちご

施設栽培のいちご(果実)を用いた作物残留試験(4例)において、3%マイクロカプセル剤を1回土壌混和(20kg/10a)したところ、施用後97~111、62~76日、86~100日、124~138日の最大残留量は、<0.001, 0.013, <0.001, <0.001 ppmであった。

注) 最大残留量: 当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験(いわゆる最大使用条件下の作物残留試験)を実施し、それぞれの試験から得られた残留量。

(参考: 平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」)

表3 カズサホス作物残留試験成績

農作物	試験圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
きゅうり (施設)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	35, 42, 49日	圃場A: 0.006
			30kg/10a		38, 45, 52日	圃場B: 0.012
すいか (施設)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	95, 102日	圃場A: 0.002
			30kg/10a			圃場B: <0.001
だいこん* (根部) (露地)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	57, 64, 71日	圃場A: 0.010
			30kg/10a		64, 71, 78日	圃場B: 0.007(78日)
だいこん(葉部) (露地)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	15, 22, 57, 64, 71日	圃場A: 0.010
			30kg/10a		13, 18, 64, 71, 78日	圃場B: 0.004
かんしょ (露地)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	120, 127, 134日	圃場A: 0.004
			30kg/10a		109, 116, 123日	圃場B: 0.002
トマト (施設)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	49, 56, 63日	圃場A: <0.001
			30kg/10a		53, 60, 67日	圃場B: 0.001
メロン* (施設)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	76, 83, 90日	圃場A: 0.003(83日)
			30kg/10a		89, 96, 103日	圃場B: 0.004
にんにく (露地)	2	3%マイクロカプセル剤	土壌混和	1回	249, 256, 263日	圃場A: <0.005
			30kg/10a		215, 222, 229日	圃場B: <0.005

なす (施設)	2	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	37, 44, 51 日	圃場 A:<0.005
			30kg/10a		59, 66, 73 日	圃場 B:<0.005
さといも※ (露地)	2	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	135, 142, 149 日	圃場 A:0.008(149 日)
			30kg/10a		159, 166, 173 日	圃場 B:0.007(173 日)
<u>キャベツ</u> (施設)	4	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	61, 68, 75 日	圃場 A:<0.001
					75, 82, 89 日	圃場 B:<0.001
			20kg/10a		102, 109, 116 日	圃場 C:<0.001
					64, 71, 78 日	圃場 D:<0.001
<u>レタス</u> (施設)	4	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	55, 62, 69 日	圃場 A:<0.001
					43, 50, 57 日	圃場 B:0.002
			20kg/10a		49, 56, 63 日	圃場 C:0.005
					64, 71, 78 日	圃場 D:<0.001
<u>ほうれんそう</u> ※ (施設)	6	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	47, 54, 61 日	圃場 A:0.005
					35, 42, 49 日	圃場 B:0.004(42 日)
			20kg/10a		33, 40, 47 日	圃場 C:0.003
					36, 43, 50 日	圃場 D:0.004
			39, 46, 53 日		圃場 E:0.026	
			41, 48, 55 日		圃場 F:0.008(48 日)	
<u>いちご</u> ※ (施設)	4	3%マイクロ カプセル剤	土壌混和	1回	97, 104, 111 日	圃場 A:<0.001
					62, 69, 76 日	圃場 B:0.013(69 日)
			20kg/10a		86, 93, 100 日	圃場 C:<0.001
					124, 131, 138 日	圃場 D:<0.001

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。※印で示した作物については、申請の範囲内で最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。また、平成16年5月13日付け適用拡大申請中の作物には、二重下線を付した。

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「カズサホス」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。

7. ADIの評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成16年10月5日付厚生労働省発食安第1005003号により食品安全委員会あて意見を求めたカズサホスに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。

無毒性量：0.025 mg/kg 体重/day
(動物種) ラット
(投与方法) 混餌投与
(試験の種類) 繁殖試験

(期間) 2 世代

安全係数 : 100

ADI : 0.00025 mg/kg 体重/day

8. 諸外国における使用状況

コーデックス、米国、カナダ、欧州連合 (EU)、オーストラリア及びニュージーランドについて調査した結果、コーデックスではばれいしょ、バナナに、米国でバナナに、またオーストラリアでバナナ、かんきつ類、さとうきび等に基準値が設定されている。その他の国、地域については、残留基準は設定されていない。

9. 基準値案

(1) 残留の規制対象

カズサホス

(2) 基準値案

別添のとおりである。

なお、カズサホスには既に食品衛生法に基づく残留農薬基準が設定されている。今回変更を予定している基準値については、下線を付して示した。

(3) 暴露評価

食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される量のカズサホスが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量 (理論最大摂取量(TMDI)又は推定一日摂取量(EDI)) のADIに対する比は、以下のとおりである。

	推定摂取量/ADI(%) ^{注)}
国民平均	24.5
幼小児 (1～6歳)	50.4
妊婦	20.9
高齢者 (65歳以上)	25.7

なお、急性暴露について、米国 EPA は、急性参照用量 (Acute Reference Dose) を用いて試算し、健康確保上の懸念はないと評価している。

注) さといも、かんしょ、だいこん類の根、だいこん類の葉、キャベツ、レタス、にんにく、トマト、なす、きゅうり、すいか、メロン類果実、ほうれんそう及びいちごについては、それぞれの最大残留量の平均値 (別添の表中「作物残留試験成績」の欄において、下線付きとなっている数値) を用いて EDI 試算を行い、それ以外の食品については TMDI 試算を行った。なお、だいこん類の葉、レタス、ほうれんそう及びいちごについては、作物残留試験の実施時期、品種の相違による偏差を考慮し、作物残留試験成績のうち最大の値を暴露評価に

用いた。

TMDI 試算： 基準値案×摂取量

EDI 試算： 作物残留試験成績の平均値×摂取量

(試算の具体例) 国民平均の摂取量を用いた試算

食品名	基準値案 (ppm)	当該食品の 摂取量 (g/人/日)	残留試験成績 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	カズサホス 推定摂取量 (μ g) *1
	(A)	(B)		(C)	(A×B又はC×B)
ばれいしょ	0.02	36.6	—	—	0.73
さといも類	0.03	11.6	0.008,0.007	0.008	0.09
かんしょ	0.02	15.7	0.004,0.002	0.003	0.05
さとうきび	0.01	13.4	—	—	0.13
だいこん類の根	0.05	45.0	0.010,0.007	0.009	0.41
だいこん類の葉	0.05	2.2	0.010(\$),0.004	0.010	0.02
：	：	：	：	：	：
：	：	：	：	：	：
バナナ	0.01	12.6	—	—	0.13
計					3.27
ADI比(%)					24.5

*1 Cの値があるものについては、C×Bの値を用いた。

(4) 本剤については、平成17年5月に公表した食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の暫定基準(最終案)に含まれているが、今般、農薬取締法に基づく登録申請により残留基準を設定するため、暫定基準(案)から削除する。

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値			作物残留試験成績 ppm	暫定基準案 (最終案)
				登録保留 基準値 ppm	国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm		
ばれいしょ	0.02	0.02			0.02			0.02
さといも類(やつがしらを含む)	0.03		○	0.05			0.008,0.007	0.05
かんしょ	0.02		○	0.05			0.004,0.002	0.05
やまいも(長いもをいう)				0.05				0.05
こんにゃくいも				0.05				0.05
その他のいも類				0.05				0.05
さとうきび	0.01	0.01				0.01: オーストラリア		0.01
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.05		○	0.05			0.010,0.007	0.05
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	0.05		○	0.05			0.010(\$),0.004	0.05
かぶ類の根				0.05				0.05
西洋わさび				0.05				0.05
キャベツ	0.01		登録申請中				<0.001,<0.001,<0.001,<0.001	
ごぼう				0.05				0.05
サルシフィー				0.05				0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	0.02		登録申請中				<0.001,0.002,0.005(\$),<0.001	
にんにく	0.02		○	0.05			<0.005,<0.005	0.05
にんじん				0.05				0.05
パースニップ				0.05				0.05
トマト	0.01	0.01	○			0.01: オーストラリア	<0.001,0.001	0.01
なす	0.02		○	0.05			<0.005,<0.005	0.05
きゅうり(ガーキンを含む)	0.05		○	0.05			0.006,0.012	0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.05		経過措置	0.05				0.05
しろり				0.05				0.05
すいか	0.01		○	0.05			0.002,<0.001	0.05
メロン類果実	0.02		○	0.05			0.003,0.004	0.05
まくわうり				0.05				0.05
その他のうり科野菜				0.05				0.05
ほうれん草	0.1		登録申請中				0.005,0.004,0.003, 0.004,0.026(\$),0.008	
しょうが	0.1	0.1				0.1: オーストラリア		0.1
その他の野菜				0.05				0.05
みかん	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
なつみかんの果実全体	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
レモン	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
グレープフルーツ	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
ライム	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
その他のかんきつ類果実	0.01					0.01: オーストラリア		0.01
びわ				0.05				0.05
もも				0.05				0.05
いちご	0.05		登録申請中	0.05			<0.001,0.013(\$),<0.001,<0.001	
バナナ	0.01	0.01			0.01	0.01: アメリカ		0.01
キウイ				0.05				0.05
その他のスパイス類								0.05
その他のハーブ類								0.05

注) 基準値案のうち、今回変更を予定している基準値について下線を付した。

注) "\$"で示した、だいこん類の葉、レタス、ほうれん草及びいちごは、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を暴露評価に用いた。

注) かぼちゃについては、農薬取締法第12条の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条第1項の経過措置に対応し、農林水産省において、登録保留基準の範囲内でマイナー作物として承認している。

(答申案)

カズサホス

食品名	残留基準値
	ppm
ばれいしよ	0.02
さといも類(やつがしらを含む。)	0.03
かんしよ	0.02
さとうきび	0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根	0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉	0.05
キャベツ	0.01
レタス	0.02
にんにく	0.02
トマト	0.01
なす	0.02
きゅうり(ガーキンを含む。)	0.05
かぼちや(スカッシュを含む。)	0.05
すいか	0.01
メロン類果実	0.02
ほうれんそう	0.1
しょうが	0.1
みかん	0.01
なつみかんの果実全体	0.01
レモン	0.01
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	0.01
グレープフルーツ	0.01
ライム	0.01
その他のかんきつ類果実(注1)	0.01
いちご	0.05
バナナ	0.01

注1)「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ及びライム以外のものをいう。