

# 4-(1-メチルエチル)アニリンのラットを用いる単回経口投与毒性試験

## Single Dose Oral Toxicity Test of 4-(1-Methylethyl)aniline in Rats

### 要約

既存化学物質の安全性を評価するため、4-(1-メチルエチル)アニリンを雌雄のCrj:CD(SD)系ラットに単回経口投与し、急性毒性を検討した。

投与量は雌雄ともに700, 910, 1183, 1538および2000 mg/kgの5用量とした。

死亡動物は、雌雄とも910 mg/kg以上の用量群で投与後24時間以降3日までみられ、その多くが投与翌日に認められた。LD<sub>50</sub>値(95 %信頼限界)は雌雄ともに985 mg/kg(846～1146 mg/kg)であった。

一般状態の観察では、雌雄ともにすべての用量群で歩行異常、自発運動低下および流涎がみられ、910 mg/kg以上の用量群で流涙ならびに腹臥位、側臥位あるいは円背位が認められた。さらに一部の群で被毛の汚れおよび腹部膨満が観察された。なお、観察期間終了時まで生存していた動物では投与後2ないし3日頃まで自発運動低下、歩行異常あるいは腹部膨満が認められたが、投与後4ないし5日にはすべて回復した。

生存動物の体重は、雌雄とも投与後7および14日の測定で前回の測定値に比較して増加していた。

剖検では、雄の2000 mg/kg、雌の1183および2000 mg/kgで一部の死亡動物の膀胱あるいは胃に赤色の内容物が認められたが、その他の動物には肉眼的異常は認められなかった。

### 方法

#### 1. 被験物質

4-(1-メチルエチル)アニリン(三井化学株、東京)は、無～黄褐色の液体で水に難溶。アルコール、ベンゼン等に可溶、分子量135.20の物質である。本試験に用いたロット9701918の純度は99.27 wt%であった。

#### 2. 供試動物

5週齢のCrj:CD(SD)系ラット(SPF)雌雄各35匹を日本チャールス・リバー(株)(神奈川)から購入した。動物は検収後、試験環境に7日間馴化し、6週齢で投与した。

#### 3. 飼育

動物は、温度23±2°C、湿度55±10 %、換気回数20回/時間、照度150～300 Lx、照明時間12時間(午前7時点灯、午後7時消灯)に設定された飼育室で、(株)東京技研サービスの自動水洗式飼育機を使用し、ステンレス製

網目飼育ケージに5匹ずつ収容して飼育した。飼育ケージおよび給餌器は週1回取り換えた。動物には、オリエンタル酵母工業(株)製造の固型飼料MFを自由に摂取させ、飲料水としては、水道水を自由に摂取させた。なお、飼育室の環境調節は試験期間中、目標範囲内であった。動物の馴化期間を含め、観察期間中データの信頼性に影響を及ぼしたと思われる環境要因の変化はなかった。

#### 4. 用量設定理由

本試験に先立ち、雌雄各1群当たり2匹に125, 250, 500, 1000および2000 mg/kgを投与し、5日間にわたり中毒症状および生死の観察を行った結果、雌雄ともに2000 mg/kg群で2例全例が死亡したが、1000 mg/kg以下の群に死亡例は認められなかったことから、本試験の投与用量は雌雄ともに700～2000 mg/kgの5用量(公比1.3)を設定した。

#### 5. 群分け

動物はあらかじめ体重によって層別化し、無作為抽出法により各試験群を構成するように群分けした。動物の識別は耳介入墨法により行った。投与時の体重は、雄が170～184 g、雌が127～142 gであった。なお、余剰動物は炭酸ガス吸入法により安楽死させた。

#### 6. 投与液の調製および投与方法

被験物質は140, 182, 237, 308および400 mg/mLの濃度となるようにトウモロコシ油(ナカライトスク(株)、Lot No. V6B7902)に溶解した。すべての投与群について投与液の濃度分析を実施した結果、設定濃度の101～103 %の範囲であり、適切に調製されていた。

投与容量は体重100 gあたり0.5 mLとし、個体別に測定した体重に基づいて投与量を算出した。

投与回数は1回とし、投与前16時間絶食させた動物に金属製胃ゾンデを用いて強制経口投与した。給餌は被験物質投与後3時間に行った。

#### 7. 一般状態の観察

中毒症状および生死の観察は、投与6時間までは1時間毎に、以後1日2回、14日間にわたって実施した。

#### 8. 体重

体重は投与直前、投与後7および14日に測定し、死亡動物については死亡発見時にも測定した。

## 単回経口投与毒性試験

Table 1 Mortality and LD<sub>50</sub> values of rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline

Sex	Dose (mg/kg)	No. of animals	Number of deaths <sup>a</sup>								Mortality	LD <sub>50</sub> values <sup>b</sup> (95 % confidence limits)
			1	2	3	4	5	6	7	8 - 14		
Male	700	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0/5	985 mg/kg (846 - 1146 mg/kg)
	910	5	0	2	0	0	0	0	0	0	2/5	
	1183	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4/5	
	1538	5	1	4	-	-	-	-	-	-	5/5	
	2000	5	1	4	-	-	-	-	-	-	5/5	
Female	700	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0/5	985 mg/kg (846 - 1146 mg/kg)
	910	5	0	1	1	0	0	0	0	0	2/5	
	1183	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4/5	
	1538	5	3	2	-	-	-	-	-	-	5/5	
	2000	5	1	4	-	-	-	-	-	-	5/5	

a: Days after administration

b: LD<sub>50</sub> values estimated by Probit method

### 9. 50 %致死量(LD<sub>50</sub>)の算出

プロビット法により、投与後14日の死亡率からLD<sub>50</sub>値およびその95 %信頼限界を算出した。

### 10. 病理学検査

観察期間中の死亡例については死亡発見時に、また生存例については観察期間終了時にエーテル麻酔後放血安楽死させ解剖し、肉眼的病理所見を病理解剖所見用紙に記録した。

## 結果

### 1. 死亡率およびLD<sub>50</sub>値

死亡動物は、雌雄とも910 mg/kg以上の用量群で投与後24時間から3日の間に認められた。700, 910, 1183, 1538および2000 mg/kg群の死亡率は雌雄ともにそれぞれ0, 40, 80, 100および100 %で、LD<sub>50</sub>値(95 %信頼限界)は雌雄ともに985(846～1146)mg/kgであった。

### 2. 一般状態

雌雄ともにすべての用量群で歩行異常、自発運動低下および流涎が投与後1ないし2時間から認められた。さらに、雄の1538、雌の1183および1538 mg/kg群では投与後1時間以降、その他の910 mg/kg以上の群では投与後6時間以降に流涙ならびに腹臥位、側臥位あるいは円背位を示し死亡する動物が認められた。その他の所見として、一部の群で被毛の汚れおよび腹部膨満が観察された。なお、観察期間終了時まで生存していた動物では投与後2ないし3日頃まで自発運動低下、歩行異常あるいは腹部膨満が認められたが、投与後4ないし5日にはすべて回復した。

### 3. 体重

生存動物では雌雄とも投与後7および14日の測定で前回の測定値に比較して増加していた。

### 4. 病理所見

雄の2000 mg/kg、雌の1183および2000 mg/kgで一部の死亡動物の膀胱あるいは胃に赤色の内容物が認められたが、その他の動物には肉眼的異常は認められなかつた。

## 考察

4-(1-メチルエチル)アニリンについてラットを用いる急性経口毒性試験を実施した。

その結果、死亡動物は投与後24時間から3日の間に認められた。中毒症状として、雌雄ともに歩行異常、自発運動低下、腹臥位、側臥位、円背位、流涙、流涙、被毛の汚れおよび腹部膨満が認められた。剖検では雌雄の死亡動物で胃または膀胱に赤色内容物が認められたが、生存動物に肉眼的異常は認められなかった。LD<sub>50</sub>値(95 %信頼限界)は雌雄ともに985(846～1146)mg/kgであった。

### 連絡先

試験責任者：藤島 敦

試験担当者：藤原正孝

(財)食品農医薬品安全性評価センター

〒437-1213 静岡県磐田郡福田町塩新田582-2

Tel 0538-58-1266 Fax 0538-58-1393

### Correspondence

Authors: Atsushi Fujishima (Study director)  
Masataka Fujiwara

Biosafety Research Center, Foods, Drugs and  
Pesticides (An-Pyo Center)

582-2 Shioshindan, Fukude-cho, Iwata-gun,  
Shizuoka, 437-1213, Japan

Tel +81-538-58-1266 Fax +81-538-58-1393

# 4-(1-メチルエチル)アニリンのラットを用いる反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験

## Combined Repeat Dose and Reproductive/Developmental Toxicity Screening Test of 4-(1-Methylethyl)aniline by Oral Administration in Rats

### 要約

4-(1-メチルエチル)アニリンの6, 20および60 mg/kgをSD系(Crj:CD)のラットの交配前2週間および交配期間の2週間を通じて経口投与し、さらには雄では交配期間終了後20日間、雌では妊娠期間を通じて分娩後の哺育3日まで連続投与し、親動物の反復投与毒性および生殖能ならびに児動物の発生・発育に及ぼす影響について検討した。

#### 1. 反復投与毒性

雌の60 mg/kg群で妊娠25日に1例が死亡した。一般状態の観察では、眼貧血および流涎が雌雄とも20および60 mg/kg群で観察され、皮膚の蒼白が主として60 mg/kg群の妊娠期間の雌に観察された。

体重では、20および60 mg/kg群の雄と60 mg/kg群の妊娠期間の雌で軽度な増加抑制が認められ、摂餌量では60 mg/kg群の雄で投与期間の初期に低値が認められた。

雄の血液学検査では、20および60 mg/kg群でメトヘモグロビン比率が高値を示し、さらに60 mg/kg群でヘマトクリット値、ヘモグロビン量、赤血球数およびMCHCが低値を、MCV, MCH, 血小板数および網赤血球比率が高値を示した。血液凝固能検査では被験物質投与の影響は認められなかった。血液生化学検査では60 mg/kg群でアルブミン、A/Gおよび総ビリルビンが高値を示した。

病理学検査では、骨髄、脾臓および肝臓に被験物質の影響が示唆される変化が認められた。器官重量は、脾臓重量が雄の60 mg/kg群、雌の20および60 mg/kg群で高値を示し、肝臓重量が雄の20および60 mg/kg群ならびに雌の60 mg/kg群で高値を示した。剖検所見では脾臓の黒色化および肥大が雌雄の20および60 mg/kg群で認められ、病理組織学検査では骨髄の造血亢進(赤血球系造血)、脾臓のうっ血、色素沈着および髓外造血(赤血球系造血)が雌雄の20および60 mg/kg群で、肝臓の髓外造血が雄の60 mg/kg群、雌の20および60 mg/kg群で、肝臓(クッパー細胞)の色素沈着および肝細胞肥大が雌雄の60 mg/kg群でそれぞれ発生率の増加あるいは程度の増強が認められた。

#### 2. 生殖発生毒性

性周期、交尾能および受胎能に被験物質投与の影響は認められなかった。

分娩時観察および妊娠期間にも被験物質投与の影響は

認められなかったが、60 mg/kg群で雌雄の新生児の哺育0日の体重が低値を示し、新生児の4日の生存率が低値を示したことから、被験物質投与による出生前後の新生児の発育抑制および生存性に対する影響が示唆された。その他、出産率、出生率に被験物質投与の影響は認められず、新生児の外表、死亡児および哺育4日の剖検にも被験物質投与の影響は認められなかった。

以上の結果から、本試験条件下では4-(1-メチルエチル)アニリンの反復投与によりメトヘモグロビン血症および貧血が惹起され、それらに起因すると考えられる一般状態、血液学検査値、血液生化学検査値、骨髄、肝臓および脾臓の変化が雌雄の20 mg/kg以上の投与群で認められ、無影響量(NOEL)は雌雄とも6 mg/kg/dayと判断された。雌雄の生殖能に及ぼす影響は60 mg/kg/day投与でも認められず、無影響量は60 mg/kg/dayと判断された。児動物の発生・発育に及ぼす影響は60 mg/kg/day投与で発育抑制が認められ、新生児の4日の生存率が低値を示したことから無影響量は20 mg/kg/dayと判断された。

### 方法

#### 1. 被験物質

4-(1-メチルエチル)アニリン [三井化学(株)製造、東京、Lot No. 970918、純度99.27 wt%] は、無～黄褐色の液体であり、使用時まで室温で遮光下密栓保管した。本ロットは投与期間中安定であったことを確認した。

被験物質は、トウモロコシ油(Lot No. V7P1509、ナカライテスク(株)製造)に溶解し、1.2, 4 および12 mg/mLの濃度になるよう各群の投与液を調製した。調製後は、使用時まで冷暗条件下で密閉保管した。投与液中の被験物質は1および60 mg/mLの場合、調製後遮光下冷蔵庫保存で8日目まで安定であることを確認した。

投与液の濃度確認のため全試験群について、調製開始時に調製した各群の投与液から無作為にサンプルを抽出し投与液中の被験物質濃度の分析を実施した。その結果、投与液は設定濃度の96.5～102.0 %の範囲で調製されていた。したがって、投与液にはほぼ所定量の4-(1-メチルエチル)アニリンが含有されていたことを確認した。

#### 2. 使用動物および飼育条件

試験には、日本チャールス・リバー(株)(神奈川)から購入した生後8週齢のSprague-Dawley(Crj:CD(SD), SPF)系雌雄ラットを使用した。購入した動物は7日間

検疫・馴化飼育した後、一般状態に異常が認められなかったものを10週齢で群分けして試験に用いた。群分け終了時の体重は、雄で384～420 g、雌で213～240 gの範囲であった。

動物は、温度24±2°C、湿度55±10%、換気回数15回/時間、照度150～300 lux、照明時間12時間(午前7��点灯、午後7時消灯)に設定されたバリアシステムの飼育室でアルミ製前面・床ステンレス網目飼育ケージに1匹ずつ収容し飼育した。妊娠18日以降の母動物は哺育4日までアルミ製前面・床ステンレス網目飼育ケージに哺育トレーおよび巣作り材料(Care FRESH<sup>TM</sup>, Absorption corporation製造)を入れて飼育した。

飼料は、オリエンタル酵母工業(株)製造のNMF固型飼料(放射線滅菌飼料)を使用し、飼育期間中自由に摂取させた。飲水は、水道水を自由に摂取させた。

### 3. 群分け

動物は投与開始日の体重をもとに層別化し、無作為抽出法により1群当たり12匹を振り分けた。

### 4. 投与量、群構成、投与期間および投与方法

本試験の用量は先に実施した予備試験「4-(1-メチルエチル)アニリンのラット用いる反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験-2週間投与予備試験」の結果を参考にして決定した。すなわち、0, 10, 30, 100 および300 mg/kgを雄および雌に14日間連続経口投与した結果、300 mg/kg群で雌雄の各1例が死亡した。一般状態の変化として、眼貧血が雌雄とともに30 mg/kg群で少数例に、100および300 mg/kg群で全例に観察され、流涎および蒼白が雌雄の100および300mg/kg群ではほぼ全例に観察された。その他、散瞳、着色尿、体温低下、歩行異常および立毛等が300 mg/kg群で観察された。また、300 mg/kg群の雌雄に体重増加抑制および摂餌量の低下が認められた。雄の血液学検査では、30 mg/kg以上の投与群でヘマトクリット値、ヘモグロビン量および赤血球数が低値を示し、100および300 mg/kg群でMCVおよびMCHが高値を、MCHCが低値を示した。さらに300 mg/kg群で好中球比率が高値を、リンパ球比率が低値を示した。血液生化学検査では100および300 mg/kg群でアルブミンおよびA/Gが高値を示し、300 mg/kg群で総蛋白およびGPTが高値を示した。

剖検では、30 mg/kg以上の投与群で雌雄のほぼ全例に脾臓の黒色化および肥大が観察されたほか、雌雄の300 mg/kg群で肝臓の黒色化および肥大がほぼ全例に、腎臓の黒色化が全例に観察された。剖検時の器官重量では、雄の100 mg/kg以上、雌の30 mg/kg以上の投与群で脾臓の絶対および器官重量・体重比(相対重量)が高値または高値傾向を示し、100および300 mg/kg群で肝臓の絶対および相対重量が高値を示した。さらに、雄の100および300 mg/kg群で精巣の相対重量の高値、雌雄の300 mg/kg群で胸腺の絶対および相対重量が低値または低値傾向を、腎臓の相対重量が高値を示した。

以上の結果から、本試験の最高用量を明らかな毒性兆

候が現れることが予想される60 mg/kgに設定し、以下公比約3で除し、20および6 mg/kgを設定した。

投与容量は、体重100 g当り0.5 mLとし、交配前および交配期間中の雌雄では、個体別に測定した最新体重に基づいて算出を行った。また、妊娠期間および哺育期間中の雌は、妊娠0, 7, 14, 21および哺育0日に測定した個体別体重に基づいて算出を行った。胃ゾンデを用いて毎日1回(7日/週)強制経口投与した。対照群にはトウモロコシ油のみを同様に投与した。

雄の投与期間は、交配前14日間と交配期間14日間および交配期間終了後20日間の連続48日間とした。雌の投与期間は、交配前14日間と交配期間中(最長4日間)ならびに交尾成立雌の妊娠期間を通じて分娩後の哺育3日まで(41～45日間)とした。

### 5. 観察および検査

#### 1) 一般状態

雌雄とも、全例について試験期間中毎日観察した。

#### 2) 体重

雄では、投与1(投与開始日), 8, 15, 22, 29, 36, 43および49日(剖検日)に測定し、投与1から43日までの体重増加量を算出した。

雌では、投与1(投与開始日), 8および15日に測定し、投与1から15日までの体重増加量を算出した。また、交尾成立後の雌は、妊娠0, 7, 14および21日に、分娩した雌は哺育0および4日に測定し、それぞれ妊娠0から21日および哺育0から4日までの体重増加量を算出した。

#### 3) 摂餌量

雄では、投与1(投与開始日), 8, 15, 22, 29, 36, 43および48日(剖検前日)に餌重量を測定し、測定日から次の測定日までの摂餌量を求め平均1日摂餌量を算出するとともに投与1から15日および投与22から48日までの累積摂餌量を算出した。

雌では、投与1(投与開始日), 8および15日に測定し、測定日から次の測定日までの摂餌量を求め、平均1日摂餌量を算出するとともに投与1から15日までの累積摂餌量を算出した。また、交尾成立の雌は妊娠0, 7, 14および21日に、分娩した雌は哺育0および4日に餌重量を測定し、測定日から次の測定日までの摂餌量を求め、平均1日摂餌量を算出するとともに妊娠0から21日までの累積摂餌量を算出した。なお、交配期間中の摂餌量は測定しなかった。

#### 4) 交配

交配前14日間の性周期観察を行った雌を同群内の雄のケージに入れ1対1で最長14日間毎晩同居させた。翌朝、陰嚢中の精子確認をもって交尾が成立したとし、その日を妊娠0日とした。性周期観察は交尾成立日までを行い、発情期から次の発情期までの間の日数を性周期日数として平均性周期を算出した。交配結果から、各群について交尾率 [(交尾動物数/同居動物数) × 100] を算出

した。

### 5) 自然分娩時および新生児の観察

妊娠動物は全例を自然分娩させた。分娩の確認は午前9~10時に行い、この時間帯に分娩が完了していることを確認した個体についてその日を哺育0日とした。午前10時を過ぎて分娩が完了した個体については、翌日を哺育0日とした。分娩を確認した全例について妊娠期間(哺育0日の年月日から妊娠0日の年月日を減じた日数)、受胎率[(受胎動物数/交尾動物数)×100]、出産率[(生児出産数/妊娠雌数)×100]、着床率[(着床痕数/妊娠黄体数)×100]、分娩率[(総出産児数/着床痕数)×100]、出生率[(出産児数/総出産児数)×100]を算出した。

新生児は哺育0日に出産児数(生存児+死亡児)を調べ、性別を判定するとともに外表異常の有無を調べた。また、哺育0および4日に雌雄個体別の重量を測定し、1腹の雌雄別平均体重を算出した。

哺育4日の新生児の同腹児重量を測定後に新生児全例をエーテル麻酔により安楽死させ、器官・組織の肉眼観察を行った。なお、哺育期間中の死亡児についても同様に主要器官の肉眼観察を行った。また、新生児の4日の生存率[(哺育4日生児数/出産生児数)×100]を求めた。

### 6) 臨床検査

各群の雄全例について剖検時に実施した。動物を最終投与日(投与期間:48日間)の夕方から翌朝まで約16時間絶食させた後、エーテル麻酔下で開腹し、腹部大動脈から採血した。

#### a) 血液学検査

検査はEDTA-2Kを添加した初血について、THMS H-1E(米国マイルス社)を用いて白血球数(WBC:暗視野板法)、赤血球数(RBC:暗視野板法)、ヘマトクリット値(HCT:RBC、MCVより算出)、ヘモグロビン量(HGB:シアシメントヘモグロビン法)、平均赤血球容積(MCV:暗視野板法)、平均赤血球血色素量(MCH:HGB、RBCより算出)、平均赤血球血色素濃度(MCHC:HGB、HCTより算出)、血小板数(PLT:暗視野板法)および白血球百分率(フローサイトケミストリー法)を測定した。白血球百分率は前述の機器で測定したが、別途血液塗末標本を作製し、メイ・グリュンワルド・ギムザ染色して保管した。網赤血球(RC)比率の算定については、EDTA-2K添加血液をニューメチレンブルーで染色後、血液塗末標本を作製した。高用量群で貧血傾向が認められたため、全群全例の標本の観察を行った。

#### b) 血液凝固能検査

検査にはクエン酸ソーダ添加血液を3000 r.p.m., 13分間遠心分離して得た血漿について、血液凝固測定装置KC-40(獨国アメルング社)を用いてプロトロンビン時間(PT:Quick 1段法)、活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT:クロット法)およびフィブリノーゲン量(Fibrinogen:トロンビン時間法)を測定した。

#### c) 血液生化学検査

検査は採血管に血液を採取、30分間静置後3000 r.p.m. 7分間遠心分離して得た血清について、多項目生化学自動分析装置CentriChem ENCORE II(米国ベーカー社)およびEKTACHEM 700N(米国コダック社)を用いて総蛋白(ビューレット法)、アルブミン(B.C.G.法)、A/G(計算値)、血糖(グルコースオキシダーゼ法)、中性脂肪(酵素色素法)、総コレステロール(コレステロールオキシダーゼ法)、尿素窒素(ウレアーゼアンモニウム指示薬法)、クレアチニン(Jaffé法)、総ビリルビン(ジアゾ法)、グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ(IFCC法)、グルタミン酸ビルビン酸トランスアミナーゼ(IFCC法)、 $\gamma$ -グルタミルトランスペプチダーゼ(Orlowski法)、ナトリウム(電極法)、カリウム(電極法)、塩素(電極法)、カルシウム(アルセナゾIII法)および無機リン(モリブデン酸青法)を測定した。

### 7) 病理学検査

#### a) 剖検および器官重量

##### ① 死亡動物

剖検では器官・組織の肉眼観察を行い、皮膚、乳腺、リンパ節、唾液腺、胸骨、大腿骨、骨髓(胸骨および大腿骨)、胸腺、気管、肺および気管支、心臓、甲状腺および上皮小体、舌、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、脾臓、脾臓、腎臓、副腎、膀胱、卵巣、子宮、睪丸、眼球、ハーダー腺、脳、下垂体および脊髄を10%中性緩衝ホルマリン液で固定した。

##### ② 雄動物

48日間投与した日の夕方から、約16時間絶食をさせた後エーテル麻酔下で採血し安楽死させた。器官・組織の肉眼観察を行った後、脳、胸腺、肝臓、腎臓、脾臓、副腎、精巣および精巣上体重量を測定し相対重量を算出した。また、全動物の重量測定器官に加えて心臓、精巣、前立腺、下垂体、骨髓(胸骨および大腿骨)および肉眼所見として変化が認められた器官・組織として皮膚を10%中性緩衝ホルマリン液で固定した。なお、精巣および精巣上体はブアン氏液で固定した。

##### ③ 雌動物

哺育4日にエーテル麻酔下で放血安楽死させた。器官・組織の肉眼観察を行った後、脳、胸腺、肝臓、腎臓、脾臓、副腎および卵巣重量を測定し相対重量を算出した。また、全動物の重量測定器官に加えて心臓、下垂体、骨髓(胸骨および大腿骨)および肉眼所見として変化が認められた器官・組織として舌、鼻の結節および皮膚を10%中性緩衝ホルマリン液で固定した。また、剖検時に黄体数および着床痕数を調べた。

#### b) 病理組織学検査

##### ① 死亡動物

死亡動物(雌の60 mg/kg群の1例)の皮膚、乳腺、リンパ節、唾液腺、胸骨、大腿骨、骨髓(胸骨および大腿骨)、胸腺、気管、肺および気管支、心臓、甲状腺およ

び上皮小体、舌、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、脾臓、脾臓、腎臓、副腎、膀胱、卵巣、子宮、腔、眼球、ハーダー腺、脳、下垂体および脊髄について実施した。

### ② 雄動物

対照群と高用量群では脳、骨髓(胸骨および大腿骨)、胸腺、心臓、肝臓、腎臓、脾臓、副腎、精巣および精巢上体について実施し、低および中用量群では骨髓、脾臓および肝臓について実施した。

### ③ 雌動物

対照群と高用量群では脳、骨髓(胸骨および大腿骨)、胸腺、心臓、肝臓、腎臓、脾臓、副腎および卵巣について実施し、加えて高用量群の1例の皮膚および同群の1例の鼻の結節について実施した。また、低および中用量群では骨髓、脾臓および肝臓について実施した。

## 6. 統計解析

体重、摂餌量、黄体数、着床痕数、出産児数、死産児数、性比、平均性周期、妊娠期間、着床率、分娩率、出生率、外表異常発現率、新生児の4日の生存率、器官重量、相対重量、血液学および血液生化学検査値については多重比較検定<sup>1-3)</sup>を行った。

出産率、交尾率および受胎率については $\chi^2$ 検定<sup>4)5)</sup>を用いた。病理学検査の所見の発生率については、Fisherの直接確率検定法<sup>5)</sup>を用いて検定し、グレードのある所見は、-を「1」、+1を「2」、+2を「3」および+3を「4」に割り当てた後、順位と検定であるMann-WhitneyのU検定<sup>5)</sup>を用いて検定した。なお、哺育期間中の新生児に関する成績は1母体当たりの平均を1標本とした。有意水準は\*:P<0.05および\*\*:P<0.01の2段階とした。

## 結果

### 1. 反復投与毒性

#### 1) 死亡および一般状態

雌の60 mg/kg群の1例が妊娠25日(投与43日)の分娩途中に死亡した。

主な一般状態の変化として雌雄とも20 mg/kg以上の投与群で眼貧血および流涎が観察された。眼貧血は雄の20 mg/kg群では投与3から4週にかけて複数例に観察されたが、その後は少数例の発現であった。雄の60 mg/kg群では投与1週から複数例に観察され、投与期間終了まではほぼ継続して認められた。雌の20 mg/kg群では、交配前・交配期間中は少数例に、妊娠期間中は複数例に観察されたが散発的な発現であった。哺育期間中は分娩直後を中心に発現例数の増加が認められた。雌の60 mg/kg群では、投与期間を通じ20 mg/kg群に比べ発現例数の増加が認められ、交配前・交配期間中は約半数例に、剖検日を除く妊娠および哺育期間中はほぼ全例に継続して観察された。この症状は、雌雄いずれの群でも主として投与後30分から4時間に観察され、翌日には消

失したが、60 mg/kg群の雌では翌日まで継続して認められる例もあった。流涎は雌雄の20 mg/kg群で投与期間を通じ少数例にごく散発的に観察された。雄の60 mg/kg群では投与2週までは少数例に、投与3週以降は半数例以上に観察された。雌の60 mg/kg群では交配前・交配期間中は少数例に、妊娠期間中は複数例に観察された。この症状は投与直後から発現が認められ始め、おおむね投与後30分には消失する変化であった。また、皮膚の蒼白が雌の20および60 mg/kg群で観察された。この症状は20 mg/kg群では妊娠期間中に1例のみの発現であった。60 mg/kg群では交配前・交配期間中および哺育期間中はそれぞれ1例のみの発現であったが、妊娠期間中は複数例に観察された。

その他、雄では被毛の汚れ、眼分泌物、外傷、痂皮、体表面の腫瘍および縮瞳が、雌では脱毛、痂皮および体表面の腫瘍が被験物質投与群に1ないし少数例に散見された。死亡動物には、全身状態の悪化に起因すると考えられる変化として、投与41~42日に立毛および眼瞼下垂が観察された。

#### 2) 体重(Fig. 1, 2)

雌雄ともに投与期間を通じて対照群と被験物質投与群との間に統計学的に有意な差は認められなかつたが、雄では20および60 mg/kg群で投与1から43日の体重増加量が低値傾向を示し、雌では60 mg/kg群で妊娠0から21日の体重増加量が低値傾向を示した。

#### 3) 摂餌量(Fig. 3, 4)

雄では対照群に比べ60 mg/kg群で投与1から8日の平均1日摂餌量が統計学的に有意な低値を示し、投与1から15日の累積摂餌量も有意な低値を示した。雌では投与期間を通じて対照群と被験物質投与群の間に差は認められなかつた。

#### 4) 雄の血液学検査(Table 1)

対照群と比べ20および60 mg/kg群でメトヘモグロビン比率が統計学的に有意な高値を示した。さらに60 mg/kg群でヘマトクリット値、ヘモグロビン量、赤血球数およびMCHCが有意な低値を、MCV、MCH、血小板数および網赤血球比率が有意な高値を示した。血液凝固能検査では全ての検査項目において、対照群と被験物質投与群との間に差は認められなかつた。

#### 5) 雄の血液生化学検査(Table 2)

対照群と比べ60 mg/kg群でアルブミン、A/Gおよび総ビリルビンが統計学的に有意な高値を示した。その他の検査項目では対照群と被験物質投与群との間に差は認められなかつた。

#### 6) 器官重量(Table 3)

雄では、20および60 mg/kg群で対照群に比べ肝臓および腎臓の相対重量が統計学的に有意な高値を示し、さらに、60 mg/kg群では脾臓の絶対および相対重量が有




Fig. 1 Body weight change of male rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test




Fig. 2 Body weight change of female rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

意な高値を、副腎の絶対重量が有意な低値を示した。

雌では、20および60 mg/kg群で対照群に比べ脾臓の絶対および相対重量が有意な高値を示し、さらに60 mg/kg群では肝臓の相対重量が有意な高値を示した。

#### 7) 剖検所見

死亡動物は雌の60 mg/kg群の1例であった。剖検所見として脾臓の黒色化および肺の赤色化が観察された。雄では、脾臓の黒色化および肥大が20および60 mg/kg群で観察され、いずれの所見も60 mg/kg群で対照群に




Fig. 3 Food consumption of male rats treated orally with 4-(1-methylethyl) aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Significant difference from control group; \*\*: P<0.01




Fig. 4 Food consumption of female rats treated orally with 4-(1-methylethyl) aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

比べ発生率が統計学的に有意に増加した。その他、単発性に認められた所見として、腎臓の瘢痕、精巣および精巣上体の小型化、皮膚の痴皮および潰瘍が対照群および20 mg/kgで観察された。

雌では、脾臓の黒色化および肥大が20および60 mg/kg群で観察され、いずれの所見も両群ともに対照群に比べ発生率が有意に増加した。その他、胸腺の小型化、舌の潰瘍、肝臓の横隔膜ヘルニア、卵巣の囊胞およ

び鼻の結節が対照群を含む各群に単発性に観察され、脱毛が全ての被験物質投与群で単発性に観察された。

### 8) 病理組織学検査(Table 4, 5)

死亡動物では、骨髄、リンパ節、肺、胃、小腸、十二指腸、肝臓、唾液腺、腎臓、甲状腺、副腎および脳の血栓、心臓の壊死、骨髄の造血亢進(赤血球系造血)、脾臓のうっ血および色素沈着、胸腺の萎縮、肺のうっ血および浮腫、食道の変性(筋層)、びらん、細胞浸潤、錯角化症および扁平上皮増生、胃の浮腫、錯角化症および扁平上皮増生、肺外分泌部のチモーゲン顆粒減少、十二指腸の潰瘍、肝臓の脂肪化および色素沈着(クッパー細胞)、子宮内膜炎、腔の細胞浸潤、副腎の空胞変性および皮質増生が観察された。

雄では、骨髄の造血亢進(赤血球系造血)、脾臓のうっ血、色素沈着および髓外造血(赤血球系造血)が20および60 mg/kg群で観察され、このうち脾臓の色素沈着は20および60 mg/kg群で、脾臓のうっ血、髓外造血および骨髄の造血亢進(赤血球系造血)は60 mg/kg群で対照群に比べそれぞれ発生率が統計学的に有意に增加了。また、肝臓(クッパー細胞)の色素沈着、髓外造血(赤血球系造血)および肝細胞肥大が60 mg/kg群で認められ、それぞれ発生率が有意に增加了。

心臓の細胞浸潤、肝臓の脂肪化、小肉芽腫、腎臓の尿細管好塩基化および好酸性小体は各群に散見されたが、群間の発生率に有意な差は認められなかった。その他の所見は少数例あるいは単発性の変化であった。

雌では、骨髄の造血亢進(赤血球系造血)、脾臓のうっ血および色素沈着が20および60 mg/kg群で観察され、いずれの所見も両群ともに対照群に比べ発生率が有意に增加了。脾臓の髓外造血(赤血球系造血)は対照群、6, 20および60 mg/kg群でそれぞれ4, 5, 9および10例に認められ、対照群に比べ20および60 mg/kg群で発生率と程度の増強に有意な差が認められた。また、肝臓(クッパー細胞)の色素沈着および肝細胞肥大が60 mg/kg群で認められ、このうち色素沈着の発生率が有意に增加了。肝臓の髓外造血(赤血球系造血)は対照群、6, 20および60 mg/kg群でそれぞれ2, 2, 3および9例に認められ、対照群に比べ60 mg/kg群で発生率と程度の増強に有意な差が認められた。肝臓の小肉芽腫は各群に散見されたが、群間の発生率に差は認められなかった。その他の所見は少数例あるいは単発性の変化であった。なお、肉眼所見で60 mg/kg群の1例に認められた鼻の結節は、組織学的には扁平上皮乳頭腫であった。

雌雄ともに脾臓および肝臓の色素沈着の代表例においてペルリンブルー染色を実施した結果、陽性を示したため、これらの色素はヘモジテリンであると考えられた。

### 2. 生殖発生毒性

#### 1) 交尾および受胎能(Table 6)

交尾および受胎はすべての群で全例成立した。

性周期観察では、いずれの群もほぼ4~5日の性周期を示し平均性周期に群間差は認められなかった。

#### 2) 分娩および哺育(Table 7)

60 mg/kg群で対照群に比べ雄の新生児の4日の生存率が統計学的に有意な低値を示し、雌の新生児の4日の生存率も低値傾向を示した。その他、60 mg/kg群の死亡動物以外の動物には分娩状態に異常は観察されず、各群の妊娠期間、黄体数、着床痕数、出産生児数および死産児数はほぼ同様な値を示し、出産率、着床率、分娩率および出生率に群間差は認められなかった。

#### 3) 新生児の形態、体重および剖検所見

新生児の外表異常はいずれの群にも認められなかった。哺育期間中の体重では、60 mg/kg群で対照群に比べ雌雄ともに哺育0日の体重が統計学的に有意な低値を示した。

死亡児の剖検では、胸腺頸部残留が対照群、6および60 mg/kg群でそれぞれ3, 1および2例に観察された他、右鎖骨下動脈起始異常が20 mg/kg群で1例に観察されたが、いずれの所見も発生率に群間差は認められなかった。哺育4日の剖検で、雄では対照群で胸腺頸部残留が1例、60 mg/kg群で肝臓の白色斑点および緑色化が各1例に観察され、雌では60 mg/kg群で腎臓の腎孟拡張が1例に観察されたが、いずれの所見も発生率に群間差は認められなかった。

### 考察

#### 1. 反復投与毒性

雌の60 mg/kg群で1例が分娩途中に死亡した。死亡例の病理組織学検査の結果、血栓が骨髄、リンパ節、肺、胃、小腸、十二指腸、肝臓、唾液腺、腎臓、甲状腺、副腎および脳に観察された。さらにこれらの血栓による循環障害を示唆すると考えられる病変として心臓の壊死、肺の浮腫およびうっ血、十二指腸の潰瘍等が観察された。ラットでは胎児の子宮内死亡、妊娠性中毒症等の産褥性疾患による死亡動物において、全身諸臓器の血管に血栓を形成する播種性血管内凝固症候群(DIC)がおこることが知られており<sup>6)</sup>、本例も分娩途中で死亡していることから、DICが死因と考えられ、被験物質の直接的な影響によるものではないと判断された。

一般状態の観察では、眼貧血および流涎が雌雄とも20 mg/kg以上の投与群で観察され、皮膚の蒼白が60 mg/kg群の妊娠期間の雌に複数例認められた。アニリン系化合物の既存化学物質の毒性試験<sup>7, 8)</sup>においても、共通した毒性としてメトヘモグロビン血症と貧血の発生が報告されており、本試験でもメトヘモグロビン比率の増加や貧血が認められたことから、眼貧血や皮膚の蒼白はこれらに起因したものと考えられた。流涎については、3,4-ジメチルアニリン<sup>7)</sup>や3,5-ジメチルアニリン<sup>8)</sup>の投与によっても認められていることから被験物質投与に関連した変化と考えられた。

体重では、20および60 mg/kg群の雄と60 mg/kg群の妊娠期間の雌で軽度な增加抑制が認められ、摂餌量では60 mg/kg群の雄で投与期間の初期に低値を示し、それ

ぞれ被験物質投与の影響が示唆された。

雄の血液学検査では、20および60 mg/kg群でメトヘモグロビン比率が高値を示し、60 mg/kg群でヘマトクリット値、ヘモグロビン量、赤血球数およびMCHCが低値を、MCV、MCHおよび網赤血球比率が高値を示した。これらの変化は前述のメトヘモグロビン血症に起因する貧血もしくはそれに対する代償性変化を示すものと考えられた。血液凝固能検査では被験物質投与の影響は認められなかった。血液生化学検査では60 mg/kg群で総ビリルビンが高値を示し、メトヘモグロビン血症に起因した溶血を反映したものと考えられた。その他、同群でアルブミンおよびA/Gが高値を示したが、その起因は明らかではなかった。

器官重量は、脾臓重量が雄の60 mg/kg群、雌の20および60 mg/kg群で高値を示し、肝臓重量が雄の20および60 mg/kg群ならびに雌の60 mg/kg群で高値を示した。剖検所見では脾臓の黒色化および肥大が雌雄の20および60 mg/kg群で認められ、病理組織学検査では骨髄の造血亢進(赤血球系造血)、脾臓のうっ血、色素沈着および髓外造血(赤血球系造血)が雌雄の20および60 mg/kg群で、肝臓の髓外造血が雄の60 mg/kg群、雌の20および60 mg/kg群で、肝臓(クッパー細胞)の色素沈着および肝細胞肥大が雌雄の60 mg/kg群で、それぞれの発生率の増加あるいは程度の増強が認められた。肝細胞肥大については血液生化学検査や組織学的にも肝障害を示唆する変化がないことから、薬物を投与した際にしばしば観察される肝臓の機能亢進像であると考えられた。脾臓のうっ血は赤血球の処理機能が亢進する場合に認められることが知られており<sup>9)</sup>、また、脾臓および肝臓でヘモジテリンの沈着が増加していることや骨髄の造血亢進、脾臓および肝臓の髓外造血は溶血性貧血に対する代償性変化と考えられ、いずれもメトヘモグロビン血症に起因した変化と考えられた<sup>10, 11)</sup>。なお、血液学検査で60 mg/kg群の血小板数の増加が見られたが、骨髄、脾臓および肝臓の病理組織学検査において、巨核球数の変化は明確ではなく、血小板数の増加の理由は明らかにできなかった。また、雄の20および60 mg/kg群で認められた腎臓重量の高値および60 mg/kg群の副腎重量の低値は、病理組織学検査では変化は認められず被験物質投与との関連は不明であった。

以上のことから、4-(1-メチルエチル)アニリンの反復投与によりメトヘモグロビン血症および貧血が惹起され、それらに起因すると考えられる一般状態、血液学検査値、血液生化学検査値、骨髄、肝臓および脾臓の変化が雌雄の20 mg/kg以上の投与群で認められ、無影響量は雌雄とも6 mg/kg/dayと判断された。

## 2. 生殖発生毒性

性周期、交尾能および受胎能に被験物質投与の影響は認められなかった。

分娩時観察では60 mg/kg群の死亡動物1例を除く妊娠動物はいずれも正常に分娩し、妊娠期間にも被験物質投与の影響は認められなかった。60 mg/kg群で雌雄の

新生児の哺育0日の体重が低値を示し、新生児の4日の生存率が低値を示したことから、被験物質投与による出生前後の新生児の発育抑制および生存性に対する影響が示唆された。その他、出産率、出生率に被験物質投与の影響は認められず、新生児の外表にも被験物質投与の影響は認められなかった。また、死亡児および哺育4日の剖検では被験物質投与によると考えられる異常所見は観察されなかった。

以上のことから、4-(1-メチルエチル)アニリンの雌雄の生殖能に及ぼす影響は60 mg/kg/day投与でも認められず、無影響量は60 mg/kg/dayと判断された。

児動物の発生・発育に及ぼす影響は60 mg/kg/day投与で発育抑制が認められ、新生児の4日の生存率が低値を示したことから無影響量は20 mg/kg/dayと判断された。

## 文献

- 1) S. Gad and C. S. Weil, "Statistics and Experimental Design For Toxicologists," Telford Press, New Jersey, 1986, pp. 43-45.
- 2) 佐野正樹、岡山佳弘、医薬安全性研究会会報, 32, 21(1990).
- 3) M. Yoshida, *J. Japanese Soc. Comp. Statist.*, 1, 111(1988).
- 4) 佐久間昭, "薬効評価-計画と解析-I," 東京大学出版会, 東京, 1977, pp. 109-117.
- 5) 石居進, "生物統計学入門," 培風館, 東京, 1975, pp. 78-107.
- 6) 前川昭彦ら, "毒性試験講座5毒性病理学," 地人書館, 東京, 1991, p. 66.
- 7) 厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室監修, "化学物質毒性試験報告," Vol. 3, 化学物質点検推進連絡協議会, 東京, 1996.
- 8) 厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室監修, "化学物質毒性試験報告," Vol. 5, 化学物質点検推進連絡協議会, 東京, 1997.
- 9) 伊藤信行, "最新毒性病理学," 中山書店, 東京, 1994, p. 276.
- 10) 秋元健ら, "毒性試験講座15医薬品," 地人書館, 東京, 1990, pp. 99-112.
- 11) P. Greaves, "Histopathology of preclinical toxicity studies," Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1990, pp. 102-104.

連絡先

試験責任者：田中亮太  
試験担当者：坂本知恵子，大庭耕輔，伊賀達也，  
細井理代  
(財)食品農医薬品安全性評価センター  
〒437-1213 静岡県磐田郡福田町塩新田字荒浜  
582-2  
Tel 0538-58-1266 Fax 0538-58-1393

Correspondence

Authors: Ryota Tanaka (Study director)  
Chieko Sakamoto, Kousuke Oba,  
Tatsuya Iga, Masayo Hosoi  
Biosafety Research Center, Foods, Drugs and  
Pesticides (An-pyo Center)  
582-2 Shioshindan Arahama, Fukude-cho, Iwata-  
gun, Shizuoka, 437-1213, Japan  
Tel +81-538-58-1266 Fax +81-538-58-1393

## 反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験

Table 1 Hematology and coagulation of male rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose level	0 mg/kg	6 mg/kg	20 mg/kg	60 mg/kg
No. of animals	12	12	12	12
HCT(%)	44.7 ± 1.9	44.0 ± 1.1	43.7 ± 1.4	40.7 ± 1.2**
HGB(g/dL)	15.4 ± 0.5	15.2 ± 0.5	15.0 ± 0.5	13.4 ± 0.3**
RBC( $\times 10^6/\text{mm}^3$ )	8.21 ± 0.39	8.17 ± 0.28	8.01 ± 0.39	6.71 ± 0.36**
MCV( $\mu\text{m}^3$ )	54.5 ± 2.0	53.8 ± 1.4	54.6 ± 1.9	60.8 ± 2.6**
MCH(pg)	18.7 ± 0.7	18.7 ± 0.5	18.7 ± 0.6	20.0 ± 0.8**
MCHC(%)	34.4 ± 0.5	34.7 ± 0.3	34.2 ± 0.4	32.9 ± 0.5**
PLT( $\times 10^3/\text{mm}^3$ )	1092 ± 86	1018 ± 160	1199 ± 95	1281 ± 151**
WBC( $\times 10^3/\text{mm}^3$ )	9.2 ± 3.4	9.5 ± 2.9	9.7 ± 3.4	10.3 ± 2.4
Differential leukocyte counts(%)				
NEUT	15 ± 5	16 ± 6	17 ± 6	15 ± 3
LYMPH	80 ± 6	79 ± 7	78 ± 6	80 ± 3
MONO	2 ± 1	2 ± 1	3 ± 1	2 ± 0
EOSN	1 ± 1	1 ± 0	1 ± 0	1 ± 0
BASO	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
LUC	1 ± 0	1 ± 0	1 ± 0	1 ± 0
Methemoglobin(%)	0.7 ± 0.1	0.8 ± 0.1	1.2 ± 0.3**	2.5 ± 0.3**
Reticulocyte(%)	28 ± 5	28 ± 4	35 ± 10	110 ± 19**
PT(sec.)	14.5 ± 0.4	14.6 ± 0.7	15.1 ± 0.7	15.1 ± 1.5
APTT(sec.)	25.3 ± 1.1	25.8 ± 1.8	25.5 ± 2.0	26.4 ± 2.2
Fibrinogen(mg/dL)	223 ± 22	231 ± 47	233 ± 28	218 ± 12

NEUT:Neutrophil LYMPH:Lymphocyte MONO:Monocyte EOSN:Eosinophil BASO:Basophil

LUC:Large unstained cells

Values are expressed as Mean±S.D.

Significant difference from control group; \*\*:P<0.01

Table 2 Blood chemistry chemical examination of male rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose level	0 mg/kg	6 mg/kg	20 mg/kg	60 mg/kg
No. of animals	12	12	12	12
T.protein(g/dL)	6.06 ± 0.21	5.92 ± 0.23	5.95 ± 0.20	6.15 ± 0.29
Albumin(g/dL)	3.39 ± 0.12	3.31 ± 0.16	3.33 ± 0.11	3.58 ± 0.17**
A/G	1.28 ± 0.09	1.27 ± 0.11	1.28 ± 0.14	1.40 ± 0.11*
Glucose(mg/dL)	149 ± 13	145 ± 10	143 ± 17	149 ± 11
Triglyceride(mg/dL)	58.8 ± 21.9	57.4 ± 29.6	55.0 ± 32.2	42.6 ± 17.3
T.cholesterol(mg/dL)	64 ± 17	68 ± 12	62 ± 9	64 ± 11
BUN(mg/dL)	13.7 ± 2.3	13.4 ± 2.7	13.0 ± 2.2	13.6 ± 1.4
Creatinine(mg/dL)	0.33 ± 0.07	0.29 ± 0.03	0.27 ± 0.03	0.28 ± 0.04
T.bilirubin(mg/dL)	0.04 ± 0.01	0.04 ± 0.01	0.04 ± 0.01	0.08 ± 0.03**
GOT(U/L)	66 ± 7	73 ± 11	83 ± 42	65 ± 8
GPT(U/L)	29 ± 5	32 ± 6	30 ± 8	27 ± 5
ALP(U/L)	364 ± 74	336 ± 56	352 ± 96	383 ± 94
Gamma-GTP(U/L)	0.4 ± 0.1	0.4 ± 0.2	0.5 ± 0.2	0.5 ± 0.1
Sodium(mmol/L)	142.6 ± 2.0	142.3 ± 1.1	141.7 ± 0.7	142.0 ± 1.2
Potassium(mmol/L)	4.09 ± 0.24	3.98 ± 0.24	4.17 ± 0.30	4.30 ± 0.18
Chloride(mmol/L)	106.8 ± 1.7	107.2 ± 1.7	106.6 ± 1.7	105.7 ± 1.0
Calcium(mg/dL)	9.93 ± 0.48	9.71 ± 0.32	9.64 ± 0.36	10.03 ± 0.50
I.phosphorus(mg/dL)	5.80 ± 0.38	5.48 ± 0.46	5.90 ± 0.42	6.24 ± 0.68

Values are expressed as Mean±S.D.

Significant difference from control group; \*:P<0.05 \*\*:P<0.01

Table 3 Absolute and relative organ weights of rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose level	0 mg/kg	6 mg/kg	20 mg/kg	60 mg/kg
<b>Male</b>				
No. of animals examined	12	12	12	12
Body weight(g)	536 ± 27	525 ± 28	513 ± 21	508 ± 27
Absolute organ weight				
Brain(g)	2.28 ± 0.10	2.26 ± 0.08	2.29 ± 0.06	2.25 ± 0.09
Thymus(mg)	290 ± 62	322 ± 85	298 ± 46	311 ± 46
Liver(g)	15.12 ± 1.80	15.07 ± 1.05	15.82 ± 1.58	16.39 ± 1.61
Spleen(g)	0.76 ± 0.11	0.79 ± 0.11	0.82 ± 0.09	1.22 ± 0.17**
Kidneys(g)	3.33 ± 0.26	3.38 ± 0.25	3.61 ± 0.31	3.47 ± 0.34
Adrenals(mg)	66 ± 8	66 ± 6	63 ± 8	56 ± 9**
Testes(g)	3.46 ± 0.39	3.44 ± 0.19	3.56 ± 0.20	3.51 ± 0.21
Epididymides(mg)	1305 ± 144	1322 ± 105	1392 ± 115	1370 ± 117
Relative organ weight				
Brain(g%)	0.427 ± 0.034	0.431 ± 0.025	0.447 ± 0.019	0.445 ± 0.028
Thymus(mg%)	53.938 ± 10.626	61.461 ± 16.356	58.287 ± 9.984	61.301 ± 8.748
Liver(g%)	2.815 ± 0.218	2.871 ± 0.135	3.083 ± 0.249**	3.223 ± 0.220**
Spleen(g%)	0.142 ± 0.021	0.150 ± 0.021	0.160 ± 0.018	0.241 ± 0.034**
Kidneys(g%)	0.622 ± 0.043	0.645 ± 0.063	0.705 ± 0.069**	0.683 ± 0.042*
Adrenals(mg%)	12.375 ± 1.524	12.500 ± 1.007	12.229 ± 1.817	11.094 ± 1.819
Testes(g%)	0.647 ± 0.079	0.657 ± 0.049	0.695 ± 0.052	0.693 ± 0.061
Epididymides(mg%)	244.010 ± 29.272	253.114 ± 31.094	271.751 ± 24.468	270.372 ± 27.772
<b>Female</b>				
No. of animals examined	12	12	12	11
Body weight(g)	298 ± 26	298 ± 21	307 ± 16	299 ± 19
Absolute organ weight				
Brain(g)	2.02 ± 0.07	2.02 ± 0.08	2.04 ± 0.09	2.03 ± 0.09
Thymus(mg)	121 ± 46	153 ± 78	124 ± 50	114 ± 31
Liver(g)	12.85 ± 2.21	12.51 ± 1.23	13.52 ± 0.90	14.43 ± 1.09
Spleen(g)	0.51 ± 0.09	0.54 ± 0.09	0.71 ± 0.12**	1.05 ± 0.16**
Kidneys(g)	2.04 ± 0.20	2.01 ± 0.20	2.09 ± 0.12	2.13 ± 0.16
Adrenals(mg)	76 ± 12	73 ± 10	77 ± 10	71 ± 8
Ovaries(mg)	102 ± 13	98 ± 19	102 ± 14	104 ± 12
Relative organ weight				
Brain(g%)	0.681 ± 0.070	0.681 ± 0.044	0.664 ± 0.031	0.680 ± 0.039
Thymus(mg%)	40.345 ± 14.873	50.505 ± 22.981	40.254 ± 15.243	37.857 ± 9.829
Liver(g%)	4.285 ± 0.423	4.198 ± 0.342	4.413 ± 0.328	4.823 ± 0.212**
Spleen(g%)	0.169 ± 0.020	0.181 ± 0.023	0.231 ± 0.032**	0.351 ± 0.053**
Kidneys(g%)	0.689 ± 0.113	0.675 ± 0.037	0.682 ± 0.051	0.713 ± 0.048
Adrenals(mg%)	25.715 ± 5.021	24.374 ± 3.315	25.119 ± 3.643	23.898 ± 3.283
Ovaries(mg%)	34.485 ± 6.284	32.687 ± 6.058	33.187 ± 4.560	34.765 ± 4.058

Values are expressed as Mean±S.D.

Significant difference from control group; \*:P&lt;0.05 \*\*:P&lt;0.01

## 反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験

Table 4 Summary of histological findings with statistical analysis treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Organ	Findings	Dose level (mg/kg) No. of animals necropsied	Male animals				Female animals			
			0 12	6 12	20 12	60 12	0 12	6 12	20 12	60 11
<b>CARDIOVASCULAR SYSTEM</b>										
heart			5	-	-	5	1	-	-	0
cellular infiltration										
<b>HEMATOPOIETIC SYSTEM</b>										
bone marrow			0	0	2	12**	0	0	4*	10**
hematopoiesis, increased										
spleen			0	0	3	12**	0	0	6**	11**
congestion			0	0	9**	12**	0	0	10**	11**
deposit, pigment			0	0	3	12**	4	5	9*	10**
hematopoiesis, extramedullary										
thymus			0	0	0	0	6	-	-	3
atrophy			0	-	-	0				
squamous metaplasia			1	-	-	3	2	-	-	2
<b>DIGESTIVE SYSTEM</b>										
liver			0	0	0	12**	0	0	0	11**
deposit, pigment			9	8	9	6	1	0	0	1
fatty change			0	0	0	6**	0	0	0	3
hypertrophy, hepatocyte			0	1	0	0	3	1	3	2
necrosis			1	0	0	0	0	0	2	1
single cell necrosis			0	0	1	0	1	0	0	0
accumulation of macrophage			1	2	2	0	0	0	0	0
cellular infiltration, lymphocyte			12	11	10	9	4	5	5	5
microgranuloma			0	0	0	7**	2	2	3	9**
hematopoiesis, extramedullary			0	0	0	0	0	1	0	0
herniation			0	0	0	0	0	1	0	0
proliferation, bile duct			0	0	0	0	0	0	0	1
<b>URINARY SYSTEM</b>										
kidney			11	-	-	11	2	-	-	2
basophilic tubules			1	-	-	1	0	-	-	1
cast, hyaline			0	-	-	0	2	-	-	0
degeneration, vacuolar			2	-	-	1	2	-	-	0
dilatation, tubules			5	-	-	9	0	-	-	0
eosinophilic body			0	-	-	1	0	-	-	0
cellular infiltration			2	-	-	2	0	-	-	0
cellular infiltration, lymphocyte			1	-	-	0	1	-	-	0
microgranuloma			1	-	-	0	0	-	-	0
fibrosis			1	-	-	0	0	-	-	0
<b>REPRODUCTIVE SYSTEM</b>										
testis			1	-	-	0	-	-	-	-
atrophy, seminiferous tube			1	-	-	0	-	-	-	-
epididymis			1	-	-	0	-	-	-	-
decrease, sperm			2	-	-	3	-	-	-	-
cellular infiltration, lymphocyte			3	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENDOCRINE SYSTEM</b>										
adrenal gland			3	-	-	5	0	-	-	0
degeneration, vacuolar			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INTEGUMENTARY SYSTEM</b>										
skin			-	-	-	-	-	-	-	-
=squamous cell papilloma			-	-	-	-	-	-	-	1(2)

=:benign #:malignant

( ) : No. of animals examined microscopically at this site. - : Not applicable.

Significant difference from control group; \*:P<0.05 \*\*:P<0.01

Table 5 Summary of histological findings with statistical analysis treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

	Male animals								Female animals							
	0	6	20	60	0	6	20	60	0	6	20	60	0	6	20	60
Dose level(mg/kg)	12	12	12	12	12	12	12	11								
No. of animals necropsied	T	1	2	3	T	1	2	3	T	1	2	3	T	1	2	3
Organ Findings																
CARDIOVASCULAR SYSTEM																
heart	-	5	0	0	-	-	-	-	-	5	0	0	-	1	0	0
HEMATOPOIETIC SYSTEM																
bone marrow	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2	0	0	-	12	0	0
hematopoiesis, increased	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12	0	0	-	0	0	0
spleen	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-	12	0	0
congestion	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12	0	0	-	0	0	0
deposit, pigment	-	0	0	0	-	0	0	0	-	9	0	0	-	12	0	0
hematopoiesis, extramedullary	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-	12	0	0
thymus	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12	0	0	-	4	0	0
atrophy	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	6	0	0
squamous metaplasia	-	1	0	0	-	-	-	-	-	3	0	0	-	2	0	0
DIGESTIVE SYSTEM																
liver	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12	0	0
deposit, pigment	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
fatty change	-	9	0	0	-	8	0	0	-	9	0	0	-	6	0	0
hypertrophy, hepatocyte	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6	0	0
necrosis	-	0	0	0	-	1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
single cell necrosis	-	1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
accumulation of macrophage	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	0	-	0	0	0
cellular infiltration, lymphocyte	-	1	0	0	-	2	0	0	-	2	0	0	-	0	0	0
microgranuloma	-	12	0	0	-	11	0	0	-	10	0	0	-	9	0	0
hematopoiesis, extramedullary	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7	0	0	-	2	0	0
herniation	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	0
proliferation, bile duct	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
URINARY SYSTEM																
kidney	-	11	0	0	-	-	-	-	-	11	0	0	-	2	0	0
basophilic tubules	-	1	0	0	-	-	-	-	-	1	0	0	-	0	0	0
cast, hyaline	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0
degeneration, vacuolar	-	2	0	0	-	-	-	-	-	1	0	0	-	2	0	0
eosinophilic body	-	5	0	0	-	-	-	-	-	9	0	0	-	0	0	0
cellular infiltration	-	0	0	0	-	-	-	-	-	1	0	0	-	0	0	0
cellular infiltration, lymphocyte	-	2	0	0	-	-	-	-	-	2	0	0	-	0	0	0
microgranuloma	-	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	0	0
fibrosis	-	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0
REPRODUCTIVE SYSTEM																
testis	-	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
atrophy, seminiferous tube	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
epididymis	-	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
decrease, sperm	-	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
cellular infiltration, lymphocyte	-	2	0	0	-	-	-	-	-	3	0	0	-	-	-	-
ENDOCRINE SYSTEM																
adrenal gland	-	3	0	0	-	-	-	-	-	5	0	0	-	-	-	-
degeneration, vacuolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
INTEGUMENTRY SYSTEM																
skin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-
=squamous cell papilloma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

T:tumor 1:slight 2:moderate 3:marked

=benign #:malignant

( ):No. of animals examined microscopically at this site. -:Not applicable.

Significant difference from control group; \*\*:P&lt;0.01

反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験

Table 6 Summary of reproductive performance in rats treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose level	0 mg/kg	6 mg/kg	20 mg/kg	60 mg/kg
No. of pairs mated	12	12	12	12
No. of pairs copulated	12	12	12	12
No. of pregnant females	12	12	12	12
Copulation index(%) <sup>a)</sup>	100.0	100.0	100.0	100.0
Fertility index(%) <sup>b)</sup>	100.0	100.0	100.0	100.0
Estrus cycle(days,Mean±S.D.)	4.2 ± 0.4	4.5 ± 0.5	4.7 ± 0.6	4.7 ± 0.6

a) : (No. of animals with successful copulation/no. of animals mated)×100

b) : (No. of pregnant animals/no. of animals with successful copulation)×100

Values in parentheses are expressed no. of animals observed

Table 7 Findings of delivery in dams treated orally with 4-(1-methylethyl)aniline and observations on their pups( $F_1$ ) in the combined repeat dose and reproductive/developmental toxicity screening test

Dose level	0 mg/kg	6 mg/kg	20 mg/kg	60 mg/kg
No. of dams observed	12	12	12	11
No. of dams delivered live pups	12	12	12	11
Duration of gestation(Mean ± S.D.)	22.7 ± 0.5	22.3 ± 0.5	22.6 ± 0.5	22.2 ± 0.4
No. of total corpora lutea(Mean ± S.D.)	213(17.8 ± 2.6)	202(16.8 ± 2.8)	208(17.3 ± 1.9)	212(19.3 ± 3.5)
No. of total implants(Mean ± S.D.)	201(16.8 ± 2.3)	183(15.3 ± 3.3)	191(15.9 ± 1.5)	183(16.6 ± 2.3)
No. of total pups born(Mean ± S.D.)	191(15.9 ± 1.8)	172(14.3 ± 3.2)	177(14.8 ± 3.2)	172(15.6 ± 2.5)
No. of total live pups born(Mean ± S.D.)	191(15.9 ± 1.8)	169(14.1 ± 3.1)	176(14.7 ± 3.1)	172(15.6 ± 2.5)
Male	88( 7.3 ± 1.7) <sup>d)</sup>	82( 6.8 ± 2.7) <sup>d)</sup>	88( 6.6 ± 2.8) <sup>d)</sup>	80( 7.3 ± 2.1) <sup>d)</sup>
Female	103( 8.6 ± 2.5) <sup>d)</sup>	87( 7.3 ± 3.0) <sup>d)</sup>	97( 8.1 ± 3.3) <sup>d)</sup>	92( 8.4 ± 3.0) <sup>d)</sup>
Sex ratio(male/female, Mean ± S.D.)	1.06 ± 0.87	1.27 ± 0.99	0.95 ± 0.48	1.01 ± 0.56
No. of total live pups on day 4(Mean ± S.D.)				
Male	85( 7.1 ± 1.9)	78( 6.5 ± 2.8)	77( 6.4 ± 2.6)	68( 6.2 ± 1.8)
Female	97( 8.1 ± 2.2)	82( 6.8 ± 3.0)	94( 7.8 ± 3.2)	81( 7.4 ± 3.2)
No. of total dead pups born(Mean ± S.D.)	0( 0.0 ± 0.0)	3( 0.3 ± 0.6)	1( 0.1 ± 0.3)	0( 0.0 ± 0.0)
stillbirth	0( 0.0 ± 0.0)	0( 0.0 ± 0.0)	1( 0.1 ± 0.3)	0( 0.0 ± 0.0)
cannibalism	0( 0.0 ± 0.0)	3( 0.3 ± 0.6)	0( 0.0 ± 0.0)	0( 0.0 ± 0.0)
Gestation index(%) <sup>a)</sup>	100.0	100.0	100.0	100.0
Implantation index(%,Mean S.D.) <sup>b)</sup>	94.7 ± 5.9	90.1 ± 11.3	92.5 ± 10.3	87.5 ± 11.3
Delivery index(%,Mean S.D.) <sup>c)</sup>	95.4 ± 4.5	94.0 ± 5.6	91.8 ± 15.2	94.0 ± 6.7
Live birth index(%,Mean S.D.) <sup>d)</sup>	100.0 ± 0.0	98.4 ± 3.9	99.5 ± 1.8	100.0 ± 0.0
Viability index on day 4(%,Mean S.D.) <sup>e)</sup>				
Male	96.4 ± 8.9	94.3 ± 10.7	98.5 ± 5.2	85.7 ± 14.1*
Female	95.1 ± 5.2	94.6 ± 10.8	97.2 ± 5.3	86.4 ± 24.3

a) : (No. of females with live pups/no. of pregnant females)×100

b) : (No. of implants/no. of corpora lutea)×100

c) : (No. of pups born/no. of implants)×100

d) : (No. of live pups born/no. of pups born)×100

e) : (No. of live pups on day 4 after birth/no. of live pups born)×100

f) : Includes live pups died before observations

Values in parentheses are expressed number of animals examined

Significant difference from control group; \*:P<0.05