

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成16年12月1日～平成17年3月31日)

(薬効分類順)

| 薬効別     | 成分名   | 副作用名   | 報告件数                  |
|---------|---|--|-----------------------|
| 解熱鎮痛消炎剤 | 1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg   | 臭素疹  | 1                     |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg  | アナフィラキシーショック<br>アナフィラキシー様反応                            | 1<br>1                |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 2錠中イブプロフェン150mg   | アナフィラキシー反応   | 1                     |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15mg   | ショック<br>中毒性皮疹  | 1<br>1                |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg   | アナフィラキシーショック   | 1                     |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg  | 肝障害<br>皮膚粘膜発疹<br>横紋筋融解<br>意識レベルの低下<br>スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 総合感冒剤   | 1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg   | 出血性腸炎  | 1                     |
| 総合感冒剤   | 1包(2.2g)中アセトアミノフェン235mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, グアヤコールスルホン酸カリウム50mg, 無水カフェイン30mg, リボフラビン2.5mg, アスコルビン酸100mg, 葛根湯乾燥エキス380mg                          | スティーブンス・ジョンソン症候群                                       | 1                     |
| 総合感冒剤   | 1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, アスコルビン酸83.3mg, アスコルビン酸ナトリウム83.3mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス粉末96mg                | 間質性肺疾患   | 1                     |
| 総合感冒剤   | 1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイプチアミン8mg, リボフラビン4mg | 横紋筋融解<br>薬疹  | 1<br>1                |
| 総合感冒剤   | 1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイプチアミン8mg, リボフラビン4mg               | 肝障害<br>多形紅斑  | 1<br>1                |
| 総合感冒剤   | 3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキヨ  | スティーブンス・ジョンソン症候群<br>急性肝炎                               | 1<br>1                |
| 総合感冒剤   | 3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルファイト24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg                           | 薬疹   | 1                     |
| 総合感冒剤   | 1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg, グリシン60mg, ケイヒ末50mg   | 肝障害<br>間質性肺疾患  | 1<br>1                |
| 総合感冒剤   | 3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルファイト24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg                           | 幻覚   | 1                     |
| 総合感冒剤   | 3包(4.5g)中アセトアミノフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, ヒベンズ酸チペビジン37.5mg, ノスカピン24mg, ヘスペリジン20mg  | 痙攣<br>意識レベルの低下   | 1<br>1                |
| 総合感冒剤   | 6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg                     | 肝炎   | 1                     |
| 総合感冒剤   | 9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg   | 低血糖症   | 1                     |
| 総合感冒剤   | 9錠アセトアミノフェン900mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, グアイフェネシン240mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, ベンフォチアミン24mg, 無水カフェイン90mg  | 薬物過敏症  | 1                     |

| 薬効別   | 成分名  | 副作用名                             | 報告件数                  |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|
| 総合感冒剤 | 9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg  | 脳梗塞                              | 1                     |
| 総合感冒剤 | 3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg         | 薬疹                               | 1                     |
| 総合感冒剤 | 3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg                    | ステークス・ジョンソン症候群<br>ステークス・ジョンソン症候群 | 1<br>1                |
| 総合感冒剤 | 9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)9.0mg(力価), ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg    | 食欲減退<br>倦怠感<br>胸痛<br>紅斑<br>発熱    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 総合感冒剤 | 3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg      | 肝障害<br>意識レベルの低下<br>間質性肺疾患        | 1<br>1<br>1           |
| 総合感冒剤 | 9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸プロムヘキシン12mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg  | 出血性素因                            | 1                     |
| 総合感冒剤 | 6錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg  | アナフィラキシーショック                     | 1                     |
| 総合感冒剤 | 9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg   | 中毒性表皮壊死融解症                       | 1                     |
| 総合感冒剤 | 9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg   | 急性全身性発疹性膿疱症                      | 1                     |
| 総合感冒剤 | 6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg   | 薬疹                               | 1                     |
| 総合感冒剤 | 9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg   | 無顆粒球症                            | 1                     |
| 総合感冒剤 | 6錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, 無水カフェイン75mg  | 中毒性表皮壊死融解症                       | 1                     |
| 総合感冒剤 | 9錠中アセトアミノフェン900mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, ビタミンB1硝酸塩24mg, ビタミンB2 12mg, ビタミンCカルシウム塩(アスコルビン酸カルシウム)500mg        | 中毒性表皮壊死融解症                       | 1                     |
| 総合感冒剤 | 9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)6.0mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg | 中毒性表皮壊死融解症<br>肺職炎                | 1<br>1                |
| 総合感冒剤 | 9錠トラネキサム酸750mg, アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, グアヤコールスルホン酸カリウム150mg, 無水カフェイン                                  | 血中クレアチニン増加<br>血中クレアチニンホスホキナーゼ増   | 1<br>1                |
| 総合感冒剤 | 9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg  | 薬疹                               | 1                     |
| 総合感冒剤 | 6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg  | ステークス・ジョンソン症候群                   | 1                     |
| 総合感冒剤 | 2385mgイブプロフェン450mg, 塩酸プロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg  | 急性全身性発疹性膿疱症                      | 1                     |

| 薬効別        | 成分名   | 副作用名                             | 報告件数                  |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 総合感冒剤      | 12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チベピジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg  | 血小板数減少<br>急性肝炎<br>横紋筋融解          | 1<br>1<br>1           |
| 総合感冒剤      | 朝・昼用(4錠) + 夜用(2錠) アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン33.3mg  | 間質性肺疾患                           | 1                     |
| 総合感冒剤      | 2カプセル中イソプロピルアントヒビリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg            | アナフィラキシー反応                       | 1                     |
| 総合感冒剤      | 6カプセル中アセトアミノフェン650mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン150mg, 麻黄湯エキス360mg(マオウ・キョウニン各1.1077g, ケイヒ830.8mg, カンゾウ553.8mg) | 中毒性表皮壊死融解症                       | 1                     |
| 骨格筋弛緩剤     | 2錠中メトカルバモール500mg, エテンザミド300mg, 無水カフェイン30mg, 酢酸トコフェロール30mg, ジベンゾイルチアミン8mg  | 光視症<br>動悸<br>意識消失<br>無力症<br>感覚減退 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 眼科用剤       | 100mL中グリチルリチン酸二カリウム0.1g, 塩酸ピリドキシン0.1g, アラントイン0.1g, メチル硫酸ネオスチグミン2mg  | アナフィラキシーショック                     | 1                     |
| 耳鼻科用剤      | 1錠中塩酸プロソイドエフェドリン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, ヨウ化イソプロパミド2mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン2mg, グリチルリチン酸二カリウム10mg, 無水カフェイン20mg  | ジスキネジー                           | 1                     |
| 耳鼻科用剤      | 1.05g中d-マレイン酸クロルフェニラミン6.0mg, 塩酸フェニレフリン15.0mg, ベラドンナエキス3.0mg, 無水カフェイン60mg  | 中毒性皮疹                            | 1                     |
| 耳鼻科用剤      | 2カプセル中ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン90mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, ブロメライン80,000単位   | 多形紅斑                             | 1                     |
| 耳鼻科用剤      | 3カプセル中塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩化リゾチーム75mg(力価), 無水カフェイン120mg  | 皮膚粘膜眼症候群<br>肝障害                  | 1<br>1                |
| 高脂血症用剤     | 6カプセル中ポリエンホスファチジルコリン1.5g  | 血中クレアチニンホスホキナーゼ増                 | 1                     |
| その他の循環器官用薬 | 3包(9g)中冠元顆粒エキス4.5g(センキュウ・シャクヤク・コウカ各2.25g, モッコウ・コウブシ各1.125g, タンジン4.5g)   | 肝機能異常                            | 1                     |
| 鎮咳去痰剤      | 1包(1g)中塩酸メキシフェナミン50mg, ノスカピン20mg, カンゾウエキス末66mg(カンゾウ330mg), グアヤコールスルホン酸カリウム90mg, 無水カフェイン50mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg   | 喘息                               | 1                     |
| 鎮咳去痰剤      | 3包(3.6g)中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン9mg, 無水カフェイン90mg, セネガ末300mg  | 薬疹                               | 1                     |
| 鎮咳去痰剤      | 12錠中カルボシステイン750mg, リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン60mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg   | 荨麻疹<br>肝機能異常<br>紅斑               | 1<br>1<br>1           |
| 鎮咳去痰剤      | 12錠中L-カルボシステイン750mg, リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン60mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg   | 急性呼吸不全                           | 1                     |
| 鎮咳去痰剤      | 3錠中ヒベンズ酸チペピジン75mg, ノスカピン30mg, キキョウ末200mg  | 紅斑<br>発疹<br>結膜充血                 | 1<br>1<br>1           |
| 鎮咳去痰剤      | 30mL中塩酸プロムヘキシン12mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸カルビノキサミン12mg   | 無力症<br>発疹                        | 1<br>1                |
| その他の呼吸器官用薬 | 6錠中トラネキサム酸750mg, カンゾウ乾燥エキス198mg(カンゾウ990mg), 塩酸ピリドキシン50mg, リボフラビン12mg, L-アスコルビン酸ナトリウム500mg   | 関節障害                             | 1                     |
| 制酸剤        | 3錠中ソファルコン100mg, ケイ酸アルミニウムマグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム200mg, ロートエキス3倍散30mg(ロートエキス10mg)   | アナフィラキシーショック                     | 1                     |
| 下剤, 洗腸剤    | 1錠(360mg)中日局アロエ末40.0mg, 日局ベラドンナエキス3.0mg, 日局トコニ末4.3mg, フェノールフタレンイン3.25mg   | 腎後性腎不全<br>尿管結石<br>急性腎不全          | 1<br>1<br>1           |
| 下剤, 洗腸剤    | 1錠中ビサコジル5mg   | 肝機能異常<br>腎結石症<br>尿管結石            | 1<br>2<br>1           |

| 薬効別                      | 成分名  | 副作用名   | 報告件数                                      |
|--------------------------|--|--|---|
| 複合胃腸剤                    | 3包(3.9g)中ケイヒ276mg, ウイキョウ72mg, ニクズク60mg, チョウジ36mg, チンピ66mg, ゲンチアナ45mg, ニガキ末45mg, 炭酸水素ナトリウム1875mg, 沈降炭酸カルシウム399mg, 炭酸マグネシウム78mg, 合成ケイ酸アルミニウム820.2mg, ビオチアスターぜ120mg | 腎後性腎不全<br>急性腎不全<br>急性肝炎  | 1<br>1<br>1                               |
| 複合胃腸剤                    | 9錠中炭酸水素ナトリウム1. 2g, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム750mg, 炭酸マグネシウム390mg, ロートエキス30mg, アルジオキサ150mg, ビオチアスターぜ1000_90mg, リパーゼAP6_30mg  | 急性呼吸不全   | 1   |
| その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬         | 2瓶(60mL)中生葉エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリヨウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブン各1g)  | 腹痛<br>血尿<br>血性下痢<br>尿閉<br>トランスマニナーゼ上昇<br>てんかん<br>嘔吐<br>恶心<br>パーキンソン病 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 外皮用殺菌消毒剤                 | 0. 3m2中ヨードホルム1. 1g   | 意識レベルの低下<br>治療薬毒性<br>落ち着きのなさ<br>譫妄                                   | 3<br>3<br>1<br>5                          |
| 外皮用殺菌消毒剤                 | 100mL中塩化ベンゼトニウム0. 01g, グリチルリチン酸二カリウム0. 12g, アラントイン0. 12g, 酢酸トコフェロール0. 1g   | 皮膚腫脹   | 1   |
| 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 1g中硫酸フラジオマイシン3.5mg, フルオシノロンアセトニド0.25mg   | 線内障  | 1   |
| 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 100g(1, 400cm <sup>2</sup> )中アルニカチンキ1mL(アルニカ0. 2g), セイヨウトチノキ種子エキス0. 1g(セイヨウトチノキ0. 6g), サリチル酸グリコール1g, l-メントール0. 3g(伸縮性)   | 蕁麻疹  | 1   |
| 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 100g中サリチル酸メチル6. 29g, l-メントール5. 71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1. 24g(1枚6. 5×4. 2cm <sup>2</sup> )  | 接触性皮膚炎   | 1   |
| 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 100g中サリチル酸グリコール1. 25g, 酢酸トコフェロール1g(伸縮性。1枚7×10cm <sup>2</sup> , 10×14cm <sup>2</sup> , 10×20cm <sup>2</sup> )   | 接触性皮膚炎   | 1   |
| 寄生性皮ふ疾患用剤                | 1mg中塩酸ブテナфин10mg   | 湿疹   | 1   |
| 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 100mL中ミノキシジル1g   | 不整脈  | 1   |
| その他の歯科口腔用薬               | 100mL中ヨウ素0. 5g   | 喉頭刺激感  | 1   |
| 総合代謝性製剤                  | 500mL中リバーコンセントレイト(肝臓エキス)12. 5g, 塩化カルニチン2. 5g, ニンジンエキス2. 5g, アミノエチルスルホン酸25g, 塩酸チアミン0. 5g, リン酸リボフラビンナトリウム0. 3g, ニコチン酸アミド2. 5g, シアノコバラミン250μg                       | 中毒性皮疹  | 1   |
| 漢方製剤                     | 2包(5.0g)中日局サイコ2.5g, 日局ハンゲ2.0g, 日局オウゴン1.0g, 日局ケイヒ1.0g, 日局シャクヤク1.0g, 日局タイソウ1.0g, 日局ニンジン1.0g, 日局カンゾウ0.5g, 日局ショウキョウ0.5g  | 劇症肝炎   | 1   |
| 漢方製剤                     | 2包(3. 75g)中乾燥エキス1. 75g(キキョウ・サイコ・センキュウ・ブクリヨウ・ボクソク各1. 5g, ボウフウ・ドクカツ各0. 75g, カンゾウ・ケイガイ・ショウキョウ各0. 5g)  | 剥脱性皮膚炎   | 1   |
| 漢方製剤                     | 3包(6g)中葛根湯エキス粉末3. 6g(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2. 25g, カンゾウ1. 5g, ショウキョウ0. 75g)   | アナフィラキシー反応   | 1   |
| その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品      | 6錠中竜胆しゃ肝湯加生姜麻黃連翹桂皮大黃水製乾燥エキス1. 2g(ジオウ・トウキ・モクツウ各2. 5g, オウゴン・タクシャ・シャゼンシ各1. 5g, カンゾウ・サンシシ・リュウタン各0. 75g, ケイヒ・ショウキョウ・ダイオウ・マオウ・レンギョウ各0. 1g)                             | 肝機能異常  | 1   |
| その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品      | 1袋中イチイ8g, タラ根皮4g, ボウイ1g, レンセンソウ0. 5g, カンゾウ2g   | 血小板減少症   | 1   |
| その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品      | 20丸(5. 2g)中ニンジン・大海馬各0. 52g, ブクリヨウ・トウニン・サンシュユ・驥腎・補骨脂各0. 156g, オウギ・ジオウ・リュウコツ・クコシ・海狗腎・鹿腎・トウキ各0. 26g, チョウジ0. 104g, 鹿茸・蛤かい尾・鮮対蝦各0. 312                                | 悪心<br>肝機能異常<br>背部痛<br>食欲不振   | 1<br>1<br>1<br>1                          |
| 他に分類されない治療を主目的としない医薬     | 1個中ニコチニ2mg   | 脳血管狭窄  | 1   |