

	一般的な名称	報告の概要
305	酢酸メドロキシプロゲステロン	酢酸メドロキシプロゲステロンを1回注入すると股関節部と腰椎の骨密度(BMD)は減少し、この傾向はその後24ヵ月間の注入時に継続して見られた。
306	塩酸タムスロシン	良性前立腺肥大症(BPH)患者に使用するタムスロシンが百内障手術中に術中虹彩筋緊張低下症候群(IFIS:Intraoperative Floppy Iris Syndrome)を引き起こす可能性が示唆された。
307	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	健康成人においてAl(OH)3とクエン酸の併用により血中Al濃度が上昇することが示された。
308	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	静注VZIG投与後に肺出血を起こし死亡した双生児の1例
309	デキサメタゾン	デキサメタゾンを含む化学療法を行った結果、DICが認められた。
310	塩酸パロキセチン水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)による新生児痙攣と新生児離脱症候群を発現した例
311	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	ショ糖含有静注用免疫グロブリン(IGIV)の投与によって発現した急性腎不全の例
312	小柴胡湯	小柴胡湯による間質性肺炎の1例
313	臭化水素酸デキストロメトルファン	CYP2D6の遺伝子多型とキニジンがデキストロメトルファンの体内動態に影響し、鎮咳作用に対して影響する可能性がある。
314	フルタミド	ラットを用いたin vivoの実験において、生殖毒性が発生することが示唆された。
315	ロキソプロフェンナトリウム	ロキソプロフェン服用中に肝障害を発症した1例
316	インドメタシン	出生前にインドメタシンを曝露された胎児は囊胞性脳室周囲白質脳症を発症するリスクが有意に高い。
317	ニトラゼパム	2つの重要なチトクロームP450酵素、CYP2D6とCYP2C19、は人間集団で多形性が存在し、それらの活性は、様々な程度の機能有意性を伴う多くの対立形質における変種の存在に関連する。
318	レボフロキサシン	急性膀胱炎に対しレボフロキサシン投与中に意識障害を呈した1例
319	シスプラチニ	術中麻酔下にてシスプラチニ、エトポシドを腹腔内投与したところ冠動脈収縮、最高血圧低下を起こした1例
320	エタネルセプト	ウェグナー肉芽腫症患者において、寛解維持に対するエタネルセプトの効果を評価する無作為プラセボ対照試験での固形癌を発症した例
321	ロキソプロフェンナトリウム	ロキソプロフェン服用中に劇症肝炎を発症した1例
322	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	雄性ラットを用い、両剤を併用した際の毒性を評価した結果、上市予定のオキサリプラチニが、臨床でテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムと併用された場合、投与方法・用量によってはテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムあるいはオキサリプラチニの毒性が増強される可能性が示唆された。
323	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	経口避妊剤の使用により、子供のアトピー性疾患のリスクが高まる可能性がある。
324	塩酸オキシコドン	持続性オピオイドを毎日複数回服用する男性において、症候性低性腺刺激ホルモン性性腺機能低下症の頻度が上昇する恐れがある。
325	プレドニゾロン	プレドニゾロンにより出血性消化性潰瘍が発症した1例
326	ジクロフェナカナトリウム	発熱に対してジクロフェナクを投与した患者において、Toxic epidermal necrolysis(TEN)が発現した1例
327	プロベネシド	本剤とモルヒネの併用により、モルヒネの活性代謝物M6GのOATP-Cによる輸送が阻害され、M6Gの血漿クリアランスが低下することが示唆された。
328	スルファメトキサゾール・トリメトリム	抗HTLV-1抗体陽性患者に発症し多剤薬剤過敏を伴ったFebrile Ulceronecrotic Mucha-Habermann's Diseaseの1例
329	塩酸ミノサイクリン	塩酸ミノサイクリン、セフォペラゾンナトリウム等を投与後に肝機能異常を発現し、その後劇症肝炎で血球貪食症候群を併発した1例

	一般的名称	報告の概要
330	アシクロビル	アシクロビルの投与により腎障害及び紫斑を発症した1例
331	クエン酸タモキシフェン	クエン酸タモキシフェン投与中に卵巣過剰刺激症候群を発現した1例
332	塩酸プソイドエフェドリン	長期間又は過量のプソイドエフェドリン投与により虚血性大腸炎を発症した1例
333	小柴胡湯	小柴胡湯が原因と考えられる薬剤性肺炎の例
334	下垂体性性腺刺激ホルモン	不妊治療中に発症した卵巣小細胞癌(大細胞亜型)の1例
335	イトラコナゾール	CYP3A4阻害剤である本剤あるいはグレープフルーツジュースの併用によるテリスロマイシンの薬物動態への影響は見られなかった。
336	クロルプロマジン・プロメタジン	母体妊娠中にフェノバルビタールを含む抗痙攣薬に暴露し、顔中央部及び指に形成不全がある子供は、知的機能に欠陥が出る恐れがある。
337	クラリスロマイシン	冠動脈疾患患者に本剤を投与した結果、あらゆる原因による死亡率はプラセボ群よりも高かった。
338	ネダプラチニン	進行食道扁平上皮癌に対しネダプラチニンを投与し、G4の好中球減少症が発現した。
339	クラリスロマイシン	冠動脈疾患患者に本剤を投与した結果、あらゆる原因による死亡率はプラセボ群よりも高かった。
340	クエン酸タモキシフェン	悪性黒色腫を含む異時性四重複癌を発症したタモキシフェン投与の1例
341	酸素	定常的高気圧酸素療法中の中枢神経系酸素中毒が通常より増大している。
342	フタラール	グルタラール製剤及びフタラール製剤の角膜内皮細胞に対する影響を検討した結果、相対的にフタラール製剤の細胞毒性が低いが、両製剤ともに多量に残留がある場合は細胞毒性がみられた。
343	ブスルファン	40歳以上の同種骨髄移植を受けた患者の問題を調査した結果、Hemorrhage, Infection, Interstitial pneumonia, VODなどが原因の移植関連死がみられた。
344	塩酸チクロピジン	塩酸チクロピジンを投与中に赤芽球ろうを発現した1例
345	インドメタシン	出生前のインドメタシン曝露が囊胞性脳室周囲白質軟化症のリスクを上昇させることが示唆された。
346	ペゲインターフェロン アルファー-2a(遺伝子組換え)	PEG-IFN、リバビリン投与中に高カリウムが生じたためポリスチレンスルホン酸ナトリウムを投与したところ、切除を必要とする虚血壊死が発現した1例
347	クロナゼパム	抗精神病薬投与中に発現したたこぼ型心筋症を合併した悪性症候群の1例
348	塩酸チクロピジン	塩酸チクロピジンを投与中に赤芽球ろうを発現した1例
349	エダラボン	イヌを対象として5日間持続静注し、その後4週間休薬してから病理組織学的検査をしたところ、末梢神経及び脊髄(背索)の神経線維変性の発現が認められた。
350	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナク坐薬を投与したところ、出血を伴うNSAID起因性直腸炎が発現した1例
351	ワルファリンカリウム	心房細動患者に対するワルファリン投与が、85歳以上およびINR値3.5以上で頭蓋内出血リスクを上昇させることが示唆された。
352	硫酸アトロピン	硫酸アトロピン及び塩酸ドブタミンを用いた心エコー検査の結果、心筋梗塞及び心室細動が認められた例
353	デキサメタゾン	デキサメタゾンを含む化学療法を行った結果、治療に関連する毒性等による死亡例が報告された。
354	メルカプトプリン	比較的低用量の6-メルカプトプリンによる炎症性大腸炎の治療において、単一施設での10年間の使用経験では、2例の悪性腫瘍(メラノーマ1例、リンパ腫1例)の発現がみられた。
355	プレドニゾロン	プレドニゾロン服用中の高齢者において術後創傷治癒遅延がみられ、植皮術を施行した1例
356	小柴胡湯	小柴胡湯による間質性肺炎の1例

	一般的の名称	報告の概要
357	ホリナートカルシウム	本剤を含む併用療法に関する臨床試験において、本剤との関連性が完全には否定できない死亡例が報告された。
358	プレドニゾロン	腎移植後に発症した皮膚カポジ肉腫の1例
359	塩化カリウム	β 2作動薬、コルチコステロイド、テオフィリンで治療中の喘息患者に対する経口塩化カリウム療法は入院期間を延長するかもしれない。
360	硫酸バリウム	胃透視検査後に腹痛、下血をきたし宿便性潰瘍を呈した1例
361	リスペリドン	リスペリドンを含めた抗精神病薬単剤投与群における糖尿病発現率は抗精神病薬非投与群に比して統計学的に有意に高かった。
362	インドメタシン	早産児における早期副腎機能障害の予防のための低用量ヒドロコルチゾン療法において、プラセボ+インドメタシン投与およびヒドロコルチゾン単独投与と比較してインドメタシン+コルチゾンを投与した乳児に胃腸穿孔が多発し、相互作用が示唆された。
363	クロルプロマジン・プロメタジン	抗てんかん薬の服用により骨折リスクが増加する恐れがある。
364	ハロペリドール	ハロペリドールの単独投与を受けた患者で糖尿病の発生率が上昇する恐れがある。
365	アセタゾラミド	イブプロフェン、アセタゾラミドの単独投与でそれぞれ催奇形性が発現し、併用投与でも同様な催奇形性が発現した。
366	トリアゾラム	高齢者に対するトリアゾラム長期投与が術後の錯乱の発現頻度を有意に上昇させることが示唆された。
367	アスピリン	本剤服用で膨疹と軽度の喘息様発作、流涙、鼻漏が生じた1例
368	ワルファリンカリウム	プロスタグランジン12製剤を用いた抗凝固療法との併用により出血が増加するおそれがある。
369	クエン酸クロミフェン	多くのう胞性卵巣症による不妊と診断され、clomipheneで排卵誘発し妊娠した場合、妊娠糖尿病あるいは妊娠高血圧の発現率が上昇する可能性がある。
370	アスピリン	アスピリンの併用で、ジドブジンの代謝が阻害されることによりジドブジンの毒性が増大する可能性がある。
371	プレドニゾロン	プレドニゾロンにより、特発性大腿骨頭壊死症が発症した1例
372	プレドニゾロン	プレドニゾロンにより重篤な特発性大腿骨頭壊死症が発症した1例
373	エタネルセプト	エタネルセプトの長期投与の結果では、重篤な有害事象、感染症、悪性腫瘍、死亡及び日和見感染症の発現の上昇は認められなかったものの、悪性腫瘍については、一般的な発現頻度を上回った結果であった。
374	シメチジン	シメチジンを服用していた男性患者に血小板数減少が発現した1例
375	塩酸ゲムシタビン	切除不能の非小細胞肺癌患者に対するシスプラチン/ゲムシタビン併用療法において、血管障害が発現した例
376	フルコナゾール	フルコナゾールを投与中に心室性頻拍症を発現した1例
377	塩酸ピルジカイニド	塩酸ピルジカイニドにて意識障害及び心電図上の著明な伝導遅延を来た透析患者の1例
378	セフォペラゾンナトリウム	血球貪食症候群を併発した劇症肝炎の1例
379	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(6)	メタアナリシスの結果、高用量(400 IU/d以上)のビタミンE補給は全死因死亡率を上昇させることが示された。
380	プレドニゾロン	プレドニゾロンにより鉄芽球性貧血が発症した1例
381	イブプロフェン	超未熟児という特殊な患者群に投与し、壞死性腸炎、尿量減少、血清クレアチニン値高値の発症数がプラセボ群に比較して有意に多いという結果が得られた。
382	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	インスリンを含む療法によるうつ血性心不全のリスク増加が示唆された。

	一般的名称	報告の概要
383	ロスバスタチンカルシウム	高齢女性において、スタチン使用と変形性股関節炎の発症との関連が示唆された。
384	ゾマトロピン	成長ホルモンにて治療中のプラダーウィー症候群の小児患者で9例の死亡例報告が判明した。
385	塩酸ゲムシタビン	進行性尿路移行上皮癌におけるパクリタキセル及びゲムシタビンweekly投与で発現した肺毒性の例
386	プレドニゾロン	大腿骨頸部骨折の病像を呈した特発性大腿骨頭壞死症の1例
387	プレドニゾロン	大腿骨頸部骨折の病像を呈した特発性大腿骨頭壞死症の1例
388	セフォペラゾンナトリウム	血球貪食症候群を併発した劇症肝炎の1例
389	ゾニサミド	ウイルス感染症または予防接種の副作用等による発熱に続いて薬剤アレルギーが加わっていた可能性が考えられる1例
390	エファビレンツ	抗レトロウィルス治療(HAART)を受けている1018人のHIV感染患者を対象に横断的な評価を行ったところ、HAARTの有無、プロテアーゼ阻害剤併用の有無にかかわらず、エファビレンツではネビラビンに比べて、より高頻度かつより早く血糖、血清脂質等の代謝異常を起こす傾向がみられた。
391	ジクロフェナクナトリウム	変形性関節症に対してジクロフェナクと柳樹皮抽出液を投与し、有効性と安全性を比較したところ、ジクロフェナク投与群で多くの副作用が報告された。
392	ジンピラミド	ニワトリ胚を使った実験において、フルコナゾールとジンピラミド併用投与によりフルコナゾール単独投与と比較して有意な心拍数の低下がみられた。
393	ガチフロキサシン水和物	ガチフロキサシン投与中に医学的に重大な低血糖及び高血糖(致死例を含む)が発現した例
394	アスピリン	凝固療法中に巨大な筋肉内出血を認めた血液透析患者の1例
395	エストラジオール	Women's Health Initiative(WHI)の臨床試験において、結合型エストロゲンの単独投与及び酢酸メドロキシプログステロン併用投与とも、尿失禁の発現や症状増悪のリスク上昇が示唆された。
396	エストロゲン[結合型]	エストロゲン単独及びエストロゲン/プロゲスチン併用のホルモン補充療法により尿失禁のリスクが上昇する。
397	ガチフロキサシン水和物	ガチフロキサシン投与中に医学的に重大な低血糖及び高血糖(致死例を含む)が発現した例
398	亜鉛華	歯科治療薬品で染色体異常発現頻度の有意な増加を認め、哺乳動物細胞において遺伝毒性を有して発癌性の可能性があることが示唆された。
399	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	インスリン治療を開始している2型糖尿病患者において、軽度および中等度非増殖網膜症がみられた患者の症状進行が認められた。
400	アルファカルシドール	アルファカルシドールによる急性腎不全のため入院加療した1例
401	インカドロン酸二ナトリウム	骨粗鬆症に対して経口投与するalendronate、risedronateなどの製剤においても同様に頸骨壊死が確認された。
402	小青竜湯	小青竜湯による薬剤性肺炎の1例
403	プロピオン酸フルチカゾン	重度の喘息/COPD患者において吸入ステロイド剤を高用量使用すると病的骨折のリスクが高くなる。
404	セボフルラン	セボフルランとバラライム(CO ₂ 吸着剤)の反応による爆発、発火の報告
405	塩酸デクスマデトミジン	PVC製の輸液セットではDEXの吸着が認められ、PE製の輸液セットでもわずかに吸着が認められた。一方、PB製の輸液セットではDEXの吸着はほとんど認められなかつた。
406	エストロゲン[結合型]	閉経後の女性に対するホルモン補充療法により脳卒中の発現リスクが上昇した。
407	硫酸鉄(2)	経口鉄剤(クエン酸第一鉄ナトリウム、硫酸鉄)とフェノール性水酸基含有医薬品の併用により錯化合物が形成される。

	一般的名称	報告の概要
408	フルバスタチナトリウム	スタチン投与は、高齢女性における新たな股関節の変形性関節症のX線写真上の所見発現のリスクをわずかに増大する可能性が示唆された。
409	エストリオール	ホルモン補充療法は卒中と、特に虚血性型のリスク増加に関連していた。
410	アスピリン	アスピリンとクロピドグレル2つの抗血小板治療は冠動脈ステント挿入後の基本的な治療であるが出血リスクとの関連がある。
411	インドメタシン	インドメタシンに起因する重篤な下部消化管病変を発現した例
412	フルコナゾール	ニワトリ胚を使った実験において、フルコナゾールとジソピラミド併用投与によりフルコナゾール単独投与と比較して有意な心拍数の低下がみられた。
413	塩酸ミキサントロン	ミキサントロンを使用した可能性のある臨床試験において、使用薬剤との関連性が完全には否定できない死亡例が報告された。
414	インフルエンザHAワクチン	インフルエンザワクチン接種1日後、ヘノッホ・シェンライン紫斑病を発症した1例
415	プレドニゾロン	ステロイド投与による耐糖能異常、線内障、骨粗鬆症の1例
416	プレドニゾロン	発熱と多関節炎を主徴とした結核症と肺炎球菌敗血症の重複感染の1例
417	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	A型肝炎、ジフテリア/破傷風、経口ポリオ、MMR-IIワクチン接種後に自己免疫性肝炎を発症した1例
418	インフルエンザHAワクチン	インフルエンザワクチン接種が原因と考えられるギラン・バレー症候群の1例
419	アセトアミノフェン	アセトアミノフェンによりTEN型薬疹を来した1例
420	ニコチニ酸トコフェロール	血管疾患患者および糖尿病患者では、ビタミンEの長期補給により癌および主要心血管疾患を予防することはできず、逆に心不全のリスクを増大させる可能性がある。
421	プロピオン酸フルチカゾン	多施設共同前向きオープン無作為群間比較試験において既知の有害事象が発生した。
422	アロプリノール	薬剤投与後に急性肝炎様に増悪した悪性リンパ腫合併原発性胆汁性肝硬変(CAH-PBC mixed type)の1例
423	酒石酸メトプロロール	メトプロロールの消失半減期はキニジンにより約2倍になり、AUCが増加する。
424	塩酸プロカルバジン	プロカルバジンは強力な性腺毒性を有する薬剤であり、COPP/ABV療法を施行した若年男性の大半が不妊症になる。
425	塩酸ピルジカイニド	本剤服用にて既知の副作用が発現した1例
426	イブプロフェン	動脈管開存症の治療においてイブプロフェンの使用は、腸管穿孔や重篤な肺高血圧症を引き起こす。
427	アミノフィリン	アミノフィリン投与後一過性にミオクローヌスを呈した高齢者の1例
428	トラニラスト	尿管結石と鑑別が困難であったトラニラストによる膀胱炎の1例
429	エストラジオール	ホルモン補充療法は卒中発作、特に虚血性卒中発作のリスク増大に関連していた。
430	硫酸バリウム	バリウム注腸検査後に直腸穿孔及びバリウムによる腹膜炎を来した1例
431	ケトコナゾール	本剤がCYP3A及びP糖蛋白による代謝を阻害しrhodamine123、ネルフィナビル、エリスロマイシンの薬物動態を有意に変化させる。
432	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	食道癌に対するテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム/ネダプラチン放射線療法(CRT)の臨床試験において、骨髄抑制のためCRT途中で一時入院管理とした例
433	テガフル・ウラシル	Docetaxel/cisplatin/UFT/LV併用化学療法において、死亡例3例(1例:敗血症及び急性腎不全、1例:G4の肝炎及び下痢、1例:G3の悪心及び下痢)が報告された。
434	酒石酸メトプロロール	アミオダロンとの併用で、本剤の血漿濃度が上昇する。

	一般的名称	報告の概要
435	メトレキサート	原発性中枢神経系リンパ腫に対するカルムスチン、メソトレキセート、プロカルバジン、デキサメタゾン(BMPD)の効果と予後因子をみた試験で、6名(11%)の患者が BMPDによる毒性で死亡した。
436	メトレキサート	腎障害を有するメトレキサート中毒の患者のカルボキシペプチダーゼG2による救援療法を検討した試験で、メトレキサートによる死亡がみられた。
437	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	デキサメタゾンを化学療法として使用し、多臓器不全を伴う重症な好中球減少による敗血症と体液貯留後の心突然死に至った例
438	フェニトイント	妊娠てんかん患者における抗てんかん薬投与は母体・胎児への影響あることが示唆された。
439	プラバスタチンナトリウム	クラリスロマイシンとプラバスタチンを併用することによりAUCがほぼ2倍に増加することが示唆された。
440	ワルファリンカリウム	ワルファリンとクランベリージュースとの間に相互作用があることについての研究報告
441	リン酸オセルタミビル	小児においてインフルエンザ治療にオセルタミビルを服用後、睡眠中に突然死を起こした症例報告がなされていること、および離乳前のラット脳内のCmaxとAUCは成熟ラットの1500倍以上であったこと等から、インフルエンザ治療にオセルタミビルを服用後の睡眠中の突然死は薬剤と関連がある可能性がある。
442	塩酸チクロピジン	アトルバスタチンとチクロピジン同時内服後に発症した薬剤性筋炎に1例
443	加熱人血漿たん白	婦人科術後のパルボウイルス感染症の例
444	乾燥弱毒生麻しんワクチン	焼肉店での会食後に発生したE型肝炎ウイルス集団感染:うち1例は劇症肝炎で死亡
445	乾燥まむしウマ抗毒素	焼肉店での会食後に発生したE型肝炎ウイルス集団感染:うち2例は劇症肝炎で死亡
446	コウジ酸	コウジ酸にはDNA障害性、染色体構造異常誘発性など光遺伝毒性作用があることが示唆された。
447	薬用歯みがき類	薬用歯みがきを使用した患者が、口内炎のため歯科医院を来院した。同医院にて含嗽剤並びにアズレンを処方した結果、炎症は回復に向かった。
448	薬用歯みがき類	薬用歯みがきを使用した患者が、全身の搔痒感、息苦しさを感じ、その後、一時的に意識喪失。病院に搬送され、点滴処置後体調が戻った。
449	薬用化粧品(クリーム剤)	本剤使用後に全身の紅斑、膿ほう、発熱が発現した例
450	アルファヒドロキシ酸	アルファヒドロキシ酸配合製品による皮膚の日光に対する感受性の亢進
451	クエン酸等の α -ヒドロキシ酸含有製品	アルファヒドロキシ酸配合製品による皮膚の日光に対する感受性の亢進
452	グリコール酸配合品	アルファヒドロキシ酸配合製品による皮膚の日光に対する感受性の亢進
453	エラグ酸、グリチルレチン酸ステアリル、酢酸ステアリル	アルファヒドロキシ酸配合製品による皮膚の日光に対する感受性の亢進