

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成16年8月1日～平成16年11月30日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静薬	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	ジスキネジー 急性胰炎	1 1
解熱鎮痛薬	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エтенザミド300mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	治療薬毒性	1
解熱鎮痛薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, エтенザミド350mg, 無水カフェイン50mg, ブロムワレリル尿素200mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エтенザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 多形紅斑 皮膚粘膜眼症候群	2 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン144mg, エтенザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	薬疹	1
解熱鎮痛薬	4錠中アセトアミノフェン600mg, エтенザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	多形紅斑 胆汁うつ滞	2 1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝障害 血管神経性浮腫 皮膚粘膜眼症候群 薬物毒性 尋麻疹	1 2 2 2 1 2
解熱鎮痛薬	1錠中エтенザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	発疹	1
かぜ薬	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	薬疹	1
かぜ薬	3包(3g)中セミアルカリプロテイナーゼ6,000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(葛根湯5.0054g), アセトアミノフェン390mg, エтенザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック 薬疹	1 1
かぜ薬	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルトイド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	肝障害	1
かぜ薬	4錠中アセトアミノフェン200mg, dl-塩酸メチルエフェドリン16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 無水カフェイン24mg, 硝酸チアミン6mg, リボフラビン2.8mg, アスコルビン酸120mg	多形紅斑	1
かぜ薬	9錠中アセトアミノフェン675mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム189mg, 無水カフェイン75mg, 塩酸フルスルチアミン26.2mg(フルスルチアミン24mg), ジリュウエキス散225mg(ジリュウ450mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペビジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	血小板数減少 固定疹 白血球数減少	1 1 1
かぜ薬	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害 血中クレアチニンホスホキナーゼ増加 腎障害 尿閉	1 1 1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
かぜ薬	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシベリン16mg	水疱	1
かぜ薬	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペビジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg	黄疸	1
かぜ薬	9錠中ナンテンジツエキス272.8mg(ナンテンジツ1.5g), カンゾウ乾燥エキス150mg(カンゾウ750mg), ヒベンズ酸チペビジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, アセトアミノフェン765mg, ジリュウ乾燥エキス58.5mg(ジリュウ450mg), d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
かぜ薬	6カプセル中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペビジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	感覚減退	1
かぜ薬	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジグ酸クロペラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	60mL中アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 無水カフェイン25mg, 小柴胡湯乾燥エキス360mg(サイコ0.7g, ハンゲ0.5g, ショウキョウ0.1g, オウゴン・タイソウ・ニンジン各0.3g, カンゾウ0.2g)	ショック	1
鼻炎用内服薬	6カプセル中塩酸プソイドエフェドリン90mg, 塩酸フェニレフリン15mg, ベラドンナ総アルカロイド0.6mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン150mg	発熱 喘息	1 1
鎮暈薬	1錠中塩酸メクリジン25mg, 臭化水素酸スコポラミン0.25mg	意識レベルの低下 浮動性めまい	1 1
その他の循環器・血液用薬	3錠中ユビデカレノン30mg, 酢酸d-α-トコフェロール10mg, ニコチン酸アミド20mg, リボフラビン6mg	動悸 無力症	1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮咳去痰薬	12錠中L-カルボシステイン750mg, リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン60mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン12mg	散瞳 複視	1 1
鎮咳去痰薬	60mL中リン酸コデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン150mg, セネガ流エキス420mg	嘔吐 蕁麻疹	1 1
口腔咽頭薬	1個中塩化セチルピリジニウム1mg, キキョウ乾燥エキス22. 2mg(キキョウ100mg)	発疹 発熱	1 1
整腸薬	6錠中ラクトミン(フェカリス菌)24mg, ラクトミン(アシドフィルス菌)54mg, ビフィズス菌24mg, セルラーゼAP3 180mg, ジメチルポリシリキサン180mg	肝障害	1
止瀉薬	12丸中オウバク末・ケイヒ末各0. 1g, ゲンチアナ末0. 05g, クレオスート0. 25g, カンゾウ末0. 23g, チンピ末0. 32g	そう痒症 鼻閉 浮腫 薬物過敏症	1 1 1 1
制酸薬	3包(4. 5g)中ゲファルナート150mg, メタケイ酸アルミニウムマグネシウム2. 268g, ロートエキス散300mg	尿路結石	1
H2受容体拮抗剤含有薬	1錠中ファモチジン10mg	突然死	1
瀉下薬	1錠中ビサコジル5mg	下痢 急性腎不全 虚血性大腸炎 消化管浮腫 水疱性皮膚炎	1 1 1 1 1
瀉下薬	1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	1包(1. 2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	劇症肝炎	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	4錠中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	肝硬変	1
外用痔疾用薬	1個(1. 75g)中酢酸プレドニゾロン1mg, リドカイン60mg, アラントイン20mg, 酢酸トコフェロール50mg	失神	1
殺菌消毒薬	0. 3m2中ヨードホルム1. 1g	構語障害 譴妄	1 1
殺菌消毒薬	100g中塩酸ジブカイン42mg, アラントイン0. 14g, 酸化亜鉛2. 8g, イソプロピルメチルフェノール0. 42g	接触性皮膚炎	1
殺菌消毒薬	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75mg	水疱 皮膚潰瘍	1 1
化膿性疾患用薬	1g中硫酸コリスチン50, 000単位, バシトラシン250単位	皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中ブフェキサマク5g, ジフェニルイミダゾール0. 2g, 酢酸トコフェロール0. 5g	剥脱性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	ジフェンヒドラミン1%, dl-塩酸メチルエフェドリン0. 5%, グリチルリチン酸二カリウム0. 5%, リドカイン0. 5%, イソプロピルメチルフェノール0. 1%, 酸化亜鉛12. 5%	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	1g中ブフェキサマク50mg, ジフェニルイミダゾール2mg, 酢酸トコフェロール5mg	発疹 光線過敏性皮疹 接触性皮膚炎	1 1 1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g(1, 400cm2)中アルニカチンキ1mL(アルニカ0. 2g), セイヨウトチノキ種子エキス0. 1g(セイヨウトチノキ0. 6g), サリチル酸グリコール1g, l-メントール0. 3g(伸縮性)	水疱	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中サリチル酸グリコール5. 56g, l-メントール5. 56g(1枚7×10cm2, 伸縮性)	多形紅斑	1
みずむし・たむし用薬	50mL中硝酸オキシコナゾール150mg, クロタミトン750mg, リドカイン300mg, l-メントール150mg, 塩化ベンザルコニウム7. 5mg	接触性皮膚炎	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
毛髪用薬	100mL中塩化カルプロニウム水和物2.18g(塩化カルプロニウム2g), カシュウチンキ3mL(カシュウ1g), チクセツニンジンチンキ3mL(チクセツニンジン1g), ヒノキチオール0.05g, パントテニールエチルエーテル1g, L-メントール0.3g	脱毛症	1
ビタミンB2B6主薬製剤	2錠中酪酸リボフラビン20mg, 塩酸ピリドキシン100mg, アスコルビン酸110mg, L-システイン40mg, ヨクイニンエキス107.7mg(ヨクイニン1.4g), ニコチニン酸アミド30mg, ビオチン0.05mg	肝障害	1
ビタミンC主薬製剤	6錠中L-システイン240mg, アスコルビン酸300mg, 塩酸ピリドキシン6mg, パントテン酸カルシウム24mg	眼瞼浮腫 発疹	1 1
ビタミンB1B6B12主薬製剤	3錠中塩酸フルスルチアミン109.16mg, 塩酸ピリドキシン100mg, シアノコバラミン1.5mg, コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg, ガンマ-オリザノール10mg, パントテン酸カルシウム30mg	肝障害	1
漢方製剤	2包(4g)中ニンジン乾燥エキス0.78g(ニンジン3g), バクモンドウ乾燥エキス0.9g(バクモンドウ2g), ゴミシ乾燥エキス0.22g(ゴミシ1.1g)	肝炎	1
漢方製剤	15錠中カシュウ3.6g	肝障害	1
漢方製剤	3錠中ニンジン100mg, イカリソウ末70mg, ビャクシ末50mg, オウレン50mg, DL-メチオニン20mg, 硝酸チアミン3mg, ニコチニン酸アミド30mg, 赤マムシ末300mg, 赤カシュウ末70mg, サンヤク末70mg, メチルテストステロン3mg, ルチン20mg, リボフラビン1mg, アスコルビン酸30mg, アミノエチルスルホン酸45mg	黄疸 肝機能異常	1 1
ビタミン含有保健薬	1瓶(50mL)中コンドロイチン硫酸ナトリウム100mg, イカリソウエキス20mg(イカリソウ200mg), エレウテロコック乾燥エキス24mg(エゾウコギ600mg), オウセイ流エキス2mL(オウセイ2g), ガラナ軟エキス12.5mg(ガラナ100mg), ゴオウ抽出液0.2mL(ゴオウ2mg), シベットチンキ30μL(シベット1.5mg), アミノエチルスルホン酸500mg, リン酸リボフラビンナトリウム5mg, 塩酸ピリドキシン10mg, ニコチニン酸アミド20mg, 酢酸トコフェロール10mg	急性肝炎	1
漢方製剤	3包(6g)中葛根湯加川きゅう辛夷水製エキス4g(カッコン・マオウ各2g, タイソウ・センキュウ・シンイ各1.5g, ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ各1g, ショウキョウ0.5g)	肝障害 薬疹	1 1
漢方製剤	3本(90mL)中葛根湯軟エキス8.3g(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)	紅斑	1
漢方製剤	3包(4.5g)中衛益顆粒乾燥エキス1.5g(オウギ6g, ビャクジュツ2g, ボウフウ2g)	感覚減退 倦怠感 耳鳴 頭痛 薬疹	1 1 1 1 1
漢方製剤	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウイ8g	間質性肺疾患 排尿困難	1 1
漢方製剤	20丸(5.2g)中ニンジン・大海馬各0.52g, ブクリヨウ・トウニン・サンシュユ・驥腎・補骨脂各0.156g, オウギ・ジオウ・リュウコツ・クコシ・海狗腎・鹿腎・トウキ各0.26g, チヨウジ0.104g, 鹿茸・蛤かい尾・鮮対蝦各0.312g, 鹿筋0.208g	肝機能異常	2
禁煙補助剤	1個中ニコチニン2mg	感覚減退 頭痛 浮動性めまい 口腔扁平苔癬	1 1 1 1
その他	9錠中トリコマイシン5万単位, クロラムフェニコール25mg(力価)	灼熱感 尿路痛 癒着 疼痛	1 1 1 1