

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。



## 成分・分量

成分	含量(1mL中)
塩酸ブテナフィン	10mg

添加物:エタノール、マクロゴール

〈成分に関連する注意〉アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

## 液容器の使い方



- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期には内圧が高まり、薬液が多くでることを防ぐためです。)
- 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなしますと、薬液がでなくなります。)

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) 火気に近づけたり、火の中に入れてしないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (6) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具などにつかないようにしてください。

## 水虫治療の5ポイント

**1** 足が蒸れないように、  
ふだんから心がけましょう。

白癬菌は温度15℃以上、湿度70%以上になると増殖します。常に蒸れを防ぎ、乾燥させることを心がけましょう。



**2** 患部を清潔にしましょう。  
毎日、石けんでよく洗うことが大切です。

1日1回の使用で効果のある商品ですが、患部を清潔にすること、長時間蒸れないように注意する、靴や靴下を清潔なままにしない(こまめに洗う)などの工夫が必要です。



**3** くすりは患部だけでなく、  
周囲まで広く、薄く塗りましょう。

白癬菌は症状が発生している範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布しましょう。




**4** 症状がなくなっても、水虫薬は  
最低1ヶ月程度、塗り続けましょう。

症状がなくなっても、白癬菌の活動を抑えているにすぎないこともあります。根気よく継続して塗り続ける事が完治への道です。



**5** ご家族に水虫の人が  
いたら、一緒に治療しましょう。

ご家族の方に水虫の人がいたら、うつります。おかしいなと思ったら早めの治療を心がけましょう。



水虫の治療に向けて毎日のトータルフットケアが大切です。

※ブテナロックにはクリームタイプもあります。

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室: 〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1  
☎0120-133250 受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:50 (土、日、祝日を除く)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

水虫・たむし治療薬 塩酸ブテナフィン配合 **医薬品**


# ブテナロック<sup>®</sup> スプレー

- 水虫・たむしは、白癬菌というカビ(真菌)が皮膚表面の角質層に寄生しておこる疾患です。白癬菌が皮膚表面の角質層等のケラチン質を侵すことによって激しいかゆみがおこります。
- ブテナロックスプレーは優れた効きめで水虫の原因菌(白癬菌)を殺菌する、水虫・たむし治療薬です。

## 商品特長

- 角質層に良く浸透し、水虫の原因菌(白癬菌)を殺菌します。
- 皮膚貯留性が優れているため、1日1回で効きます。
- 塩酸ブテナフィンを1%配合した水虫・たむし治療薬です。

ブテナロック【スプレー】の適応例  
(その他の症状にも使えます。)



【かさかさ】した水虫には「ブテナロック液」、  
【ジュクジュク】や【厚く角化】した水虫には  
ブテナロッククリーム【もあります】。

## ⚠️【使用上の注意】

### ⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)乳幼児。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)患部が広範囲の人。(7)患部が化膿している人。(8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。  
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合、又、本剤の使用により症状が悪化した場合。

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 用法・用量

1日1回、適量を患部に噴霧してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 外用にのみ使用してください。

- (5) 足の指の間にみずむしがある場合には患部より2~3cm程度近づけて噴射し、その他のみずむし・たむしには5cm程度離し、噴霧してください。
- (6) 噴霧口をよく確かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないでください。

## 成分・分量

成分	含量(1mL中)
塩酸ブテナフィン	10mg

添加物:エタノール、マクロゴール

〈成分に関連する注意〉アルコールを含んでいますので、噴霧時にしみることがあります。

## スプレーの使い方

### 本品の特長


- ・本品は広い患部に使い易いミストスプレーに、狭い患部にピンポイントで薬剤を噴射できる機能を加えた「噴霧切り替え式」のポンプスプレー剤です。
- ・症状で使い分ける他に、噴霧状態のお好みでお選びいただいても結構です。

### ご注意

- ・ボタンはカチッと合まる感覚があるまで廻してください。カチッと合まるまで廻さないとボタンが下がりにくいため噴霧できない場合があります。
- ・ボタンが下がりにくい場合は無理に下げないでください。破損の原因になります。
- ・ボタンは「■」の印と「▼」の印の間で廻してください。無理に廻すと破損の原因になります。
- ・使い始めや使用間隔があいた場合、噴霧しにくいことがあります。
- ・噴霧しにくい時は、「広い角度の噴霧」の状態で数回カチつきをすると噴霧できるようになります。


### 広い角度の噴霧(ミストスプレー)をご使用になる場合

- ① ボタン正面の縦の溝を「■」の印に合わせてカチッと合まるまで廻してください。
- ② 患部より5cm程度離し、噴霧してください。



### 狭い角度の噴射(ピンポイント)をご使用になる場合

- ① ボタン正面の縦の溝を「▼」の印に合わせてカチッと合まるまで廻してください。
- ② 患部より2~3cm程度近づけて、ねらいを定めて噴射してください。



## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) 火気に近づけたり、火の中に入れてたりしないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (6) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具などにつかないようにしてください。

## 水虫治療の5ポイント


### 1 足が蒸れないように、ふだんから心がけましょう。

白癬菌は温度15℃以上、湿度70%以上になると増殖します。常に蒸れを防ぎ、乾燥させることを心がけましょう。



### 2 患部を清潔にしましょう。毎日、石けんでよく洗うことが大切です。

1日1回の使用で効果のある商品ですが、患部を清潔にすること、長時間蒸れないように注意する、靴や靴下を不潔なままにしない(こまめに洗う)などの工夫が必要です。




### 3 くすりは患部だけでなく、周囲まで広く、薄く塗りましょう。

白癬菌は症状が発生している範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布しましょう。




### 4 症状がなくなっても、水虫薬は最低1ヶ月程度、塗り続けましょう。

症状がなくなっても、白癬菌の活動を抑えているにすぎないこともあります。根気よく継続して塗り続ける事が完治への道です。



### 5 ご家族に水虫の人がいたら、一緒に治療しましょう。

ご家族の方に水虫の人がいたら、うつります。おかしいなと思ったら早めの治療を心がけましょう。



水虫の治癒に向けて毎日のトータルフットケアが大切です。


※ブテナロックには液タイプ、クリームタイプもあります。

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00~12:00、13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

一般名	塩酸アモロルフィン	
構造式		
参 考	医療用製剤	ペキロンクリーム (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)
	医療用承認年月日等	平成 5 年 1 0 月 1 日 (再審査結果：平成 1 3 年 3 月)
	医療用効能・効果	下記の皮膚真菌症の治療 <ul style="list-style-type: none"> <li>・白癬：足白癬、手白癬、体部白癬、股部白癬</li> <li>・皮膚カンジダ症：指間びらん症、間擦疹 (乳児寄生菌性紅斑を含む)、爪炎囲</li> <li>・癬風</li> </ul>
	医療用用法・用量	1 日 1 回患部に塗布する。
一般用製剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>① トークール (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>② トール (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>③ ハイシックス (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>④ ダマリンエース (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>⑤ ダマリン EX (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>⑥ ダマリン A (1g 中アモロルフィンとして 5 mg)</li> <li>⑦ トークール液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> <li>⑧ トール液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> <li>⑨ ハイシックス液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> <li>⑩ ダマリンエース液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> <li>⑪ ダマリン EX 液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> <li>⑫ ダマリン A 液 (1mL 中アモロルフィンとして 5mg)</li> </ul>	
一般用承認年月日	①平成 14 年 10 月 18 日、②平成 14 年 10 月 18 日、③平成 14 年 10 月 18 日、 ④平成 14 年 10 月 18 日、⑤平成 14 年 10 月 18 日、⑥平成 14 年 10 月 18 日、 ⑦平成 17 年 12 月 14 日、⑧平成 17 年 12 月 14 日、⑨平成 17 年 12 月 14 日、 ⑩平成 17 年 12 月 14 日、⑪平成 17 年 12 月 14 日、⑫平成 17 年 12 月 14 日	
一般用効能・効果	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	
一般用用法・用量	1 日 1 回、適量を患部に塗布する。	

<p>一般用医薬品 市販後調査結果等</p>	<p>トール及びダマリンエースの市販後調査（第1次：平成14年10月18日～平成15年10月17日、第2次：平成15年10月18日～平成16年10月17日、第3次：平成16年10月18日～平成17年10月17日）</p> <p>※トール等8品目については未販売。</p> <p>(1) 特別調査：1,171例中4例(4件) (副作用発現率0.34%)  投与部位潰瘍(ただれ)2件、投与部位そう痒感(かゆみ)2件*  ※このうち、1件は湿疹病変への誤用による可能性</p> <p>いずれも「使用上の注意」から予測できる既知で非重篤な事象であった。</p> <p>(2) 一般調査：19例(28件)  投与部位腫脹7件、接触性皮膚炎6件、投与部位紅斑5件、投与部位発疹*、投与部位小水疱、発疹各2件、投与部位湿疹、投与部位そう痒感、眼痛、眼の異物感各1件  ※このうち、1件は湿疹病変への誤用による可能性</p> <p>ほとんどが「使用上の注意」から予測できる既知の事象であり、いずれも非重篤な事象であった。「眼痛」、「眼の異物感」については情報不足等により因果関係が評価できないことから、現時点で使用上の注意の改訂等の必要性に乏しいと考えられる。</p>
<p>対 応 案</p>	<p>アモロルフィンとして1g(mL)中5mg以下を含有する外用剤(軟膏剤及び液剤)を指定医薬品から解除する。</p>

塩酸アモロフィン配合  
**タマリン エース** 10g

1日1回 クリームタイプ

水虫・たむしに

塩酸アモロフィン配合  
**タマリン エース** 10g

1日1回 クリームタイプ

製造・発売元  
大正製薬株式会社  
東京都中央区東船場3丁目24番1号  
TEL:03-3586-3886 FAX:03-3586-3880  
http://www.taisho.co.jp

杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台2-5

使用前に説明書を必ず  
読んでください。

- 注意
1. 次の人には使用しないでください。  
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人
  2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、経等)、陰のう、外陰部等  
(2)湿疹 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部
  3. 使用に際しては、説明書をよくお読みください。
  4. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品



4 987306 034280

【効能】水虫、いんきんたむし、せにたむし  
【用法・用量】1日1回、適量を患部に塗布してください。  
【成分(1g中)】塩酸アモロフィン5.575mg  
添加物: ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリルアルコール、  
流動パラフィン、ワセリン、カルボキシセルロースポリマー、  
エデト酸Na、フェノキシエタノール、pH調節剤

製造番号 165E1  
使用期限 2011.3

4300A16KA

《トークール》  
TOE-COOL KYORIN

**みずむし・たむしに** 10g

1日1回《トークール》TOE-COOL

塩酸アモロフィン配合

KYORIN

《トークール》  
TOE-COOL KYORIN

**みずむし・たむしに** 10g

1日1回《トークール》TOE-COOL

塩酸アモロフィン配合

KYORIN

製造・発売元  
杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台2-5

使用前に説明書を必ず  
お読みください。

- 注意
1. 次の人には使用しないでください。  
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人
  2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、経等)、陰のう、外陰部等  
(2)湿疹 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部
  3. 使用に際しては、説明書をよくお読みください。
  4. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品



4 987060 005731

■効能 水虫、いんきんたむし、せにたむし  
■用法・用量 1日1回、適量を患部に塗布してください。  
■成分(1g中) 塩酸アモロフィン 5.575mg  
添加物: ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリルアルコール、  
流動パラフィン、ワセリン、カルボキシセルロースポリマー、  
エデト酸Na、フェノキシエタノール、pH調節剤

製造番号 FE19  
使用期限 2010.04

0800A59KD

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

水虫・たむし治療薬

**ダマリンエース** (水虫・たむし用薬)

塩酸アモロルフィン配合

◆ダマリンエースは有効成分塩酸アモロルフィンを主成分としたクリーム剤で、白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。(過敏症を起こした薬剤を避けて使用することが必要です)

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、腔等)、陰のう、外陰部等。(刺激が起きたり、有効成分の吸収が促進されることがあります)
- (2)湿疹。(症状が悪化することがあります)
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。(症状が悪化することがあります)



## 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります)
- (2)乳幼児。(本剤の適切な使用ができない場合があります)
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(アレルギー体質の人は本剤の使用により、アレルギー症状を起こす可能性があります)
- (4)薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(何らかの薬や化粧品等でアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります)
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。(本剤が目、口腔、鼻腔に誤って塗布される場合があります。又、広範囲の人は別な要因も考えられます)
- (6)患部が化膿している人。(症状が悪化することがあります)
- (7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かはつきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
- (8)妊婦又は妊娠していると思われる人。(薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要があります)

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、疼痛、ただれ

(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがあります)

(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合(病巣が使用前より広がる等)。(2週間位使用しても症状の改善がみられないときは、症状が重いか他の疾病によるものとするべきで、なるべく早く医師又は薬剤師に相談してください)

## 効 能

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。


21

## 用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### 〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



### 〔注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

## 成分

1g中

成分

分量

はたらき

塩酸アモロフィン


5.575mg  
(アモロフィンとして5mg)

白癬菌の細胞膜合成を2つのステップでブロックして白癬菌を殺菌し、治療効果を発揮します。

添加物：ステアリン酸ポリオキシル、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、フェノキシエタノール、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



## 水虫治療のポイント

白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。又、次のことに留意してください。

### ① 根気よく継続治療をする

かゆみがなくなっても、再発を防ぐため1カ月は本剤を使用しましょう。




### ② 患部を乾燥させる

通気性の悪い靴下やゴム長靴は好ましくありません。おれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。



### ③ 衣類も清潔にする

靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。



### ④ 患部をよく洗って清潔にする

白癬菌増殖の抑制や二次感染を防ぐため患部をよく洗い清潔に保ちましょう。



本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれる等、何かお気付の点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>



製造販売元

杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-5

4250A16KA