

(新聞発表用)

1	販売名	メンソレータムフレディCC膾錠 メンソレータムフレディカンジダキュア膾錠 カンジダキュアMF膾錠
2	一般名	イソコナゾール硝酸塩
3	申請者名	ロート製薬株式会社
4	成分・分量	1日量1錠中 イソコナゾール硝酸塩 100mg
5	用法・用量	成人（15歳以上60歳未満）1日1回（できれば就寝前）、1錠を膾深部に挿入する。6日間毎日続けて使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けること。
6	効能・効果	膾カンジダの再発。（以前に医師から、膾カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）
7	備 考	本剤は、イソコナゾール硝酸塩を有効成分とする膾錠で、膾カンジダの再発に用いる医薬品である。 一般用医薬品 区分（2） ・添付文書（案）を別紙として添付

添付文書(案)

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

膣カンジダの再発治療薬

メンソレータムフレディCC膣錠

本品の使用は、以前に医師から膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。

<膣カンジダとは？>

膣カンジダとは、カンジダという真菌(カビの仲間)によって起こる膣炎です。

女性性器の感染症の中では、よくみられる疾患ですが、適切な治療を行うことが大切です。

<膣カンジダの典型的な症状>

膣カンジダにかかると、外陰部のかゆみと、おりもの見た目や量に変化がおり、ときに、外陰部の熱感、痛み、腫脹感も伴います。おりものの性状は、膣カンジダ特有のおかゆ(カッテージチーズ)状や白く濁った酒かす状となります。

 使用上の注意

してはいけないこと (マーク)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 以前に医師から、**膣カンジダ**の診断・治療を受けたことがない人。
- (2) **膣カンジダ**の再発までの期間が2ヶ月以内の人、又は2ヶ月以上であっても、直近6ヶ月以内に2回以上感染した人。
- (3) **膣カンジダ**の再発かどうかよくわからない人。(おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状や白く濁った酒かす状でない、嫌なにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる)
- (4) 次の診断を受けた人。糖尿病
- (5) 発熱又は悪寒がある人。
- (6) 悪心又は嘔吐がある人。
- (7) 下腹部に痛みがある人。
- (8) 不規則な、又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。
- (9) **膣**又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。
- (10) 排尿痛がある人、又は排尿困難な人。
- (11) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (12) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (13) 60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児。

2. 本品を使用している間は、次のいずれの医薬品も外陰部に使用しないでください。

カンジダ治療薬以外の外皮用薬

相談すること (マーク)

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
膣	疼痛、腫脹感、発赤、刺激感、かゆみ、熱感

(2) 3日間使用しても、症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。

効能・効果

膣カンジダの再発。(以前に医師から、**膣カンジダ**の診断・治療を受けたことのある人に限る。)

成分・分量(1日量 1錠中)

有効成分	配合量
イソコナゾール硝酸塩	100mg

添加物として、乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

用法・用量

次の量を膣深部に挿入してください。6日間毎日続けて使用してください。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上 60歳未満)	1錠	1回(できれば就寝前)
15歳未満及び 60歳以上	使用しないこと	

ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。

膣錠の使い方

1. 取り出し方

(イラスト)

図のように膣錠のはいつているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、1錠取り出してください。

(誤ってそのまま使用すると、粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

2. 挿入法

(挿入時イラスト)

手指を石けんできれいに洗い、両脚を広げてしゃがみ、図のように膣錠を指先で膣内の最も深いところに挿入してください。

(アプリケーター等は使用しないでください。)

(挿入後イラスト)

挿入後、患部に接触した手指は石けんでよく洗ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) この薬は膣にのみ使用し、飲まないでください。
もし、誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の診療を受けてください。
- (2) 途中で症状が消失しても、使用開始から6日間使用してください。
- (3) 生理中は使用しないでください。使用中に生理になった場合は使用を中止してください。また、治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受けてください。

<保管及び取り扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<生活上の注意>

- (1) 膣カンジダを再発した場合には、パートナーに感染している可能性があるため、膣カンジダに感染した旨を伝え、パートナーの方は陰部のかゆみ、発赤等の不快症状があれば、すぐに医師の診療を受けてください。
- (2) パートナーへの感染を避けるため、本品を使用中は性行為を避けましょう。
- (3) 本品を使用中は、患部への刺激を避けるため、殺精子剤は使用しないようにしましょう。
- (4) 薬剤の効果を維持するため、自分で膣内を洗うことは控えましょう。
- (5) 入浴時は石けんの刺激を避けるために、外陰部は石けんで洗わず、お湯だけで軽く洗う程度にしましょう。
- (6) カンジダ菌は、温度や湿度の高い状態で繁殖しやすいため、できるだけ乾燥した状態を保つようにすることが大切です。以下の点に気を付けましょう。
 - ー入浴、水泳後等は、膣の外側は十分乾かしましょう。濡れた水着などはできるだけ早く着換えましょう。
 - ーおりものシートなどの衛生用品を使用される場合は、こまめに交換しましょう。
 - ー下着は、通気性のよい綿製品などを用いるようにしましょう。
- (7) 下着やタオルは毎日清潔なものを用い、タオルなどは感染を避けるため、家族と共用しないようにしましょう。
- (8) カンジダ菌は腸にも常在している菌です。トイレの後は腸からの感染を避けるため、前から後ろにふきましょう。
- (9) かゆみがあっても、外陰部をかかないようにしましょう。かくと、刺激がひどくなったり、感染が広がる可能性があります。

<お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク>

お気軽にお問い合わせください。女性スタッフが丁寧にお答えします。

フレディコール:06-6758-1422

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1