

みずむし・たむし用薬

# ウィンダム<sup>®</sup> クリーム

三

## ウィンダム<sup>®</sup> クリームの特徴

1. 医療用で使用されている成分「ラノコナゾール」を配合したみずむし・たむし治療薬です。
2. 患部によく浸透し、角質が厚くなってしまったみずむしにも効果を発揮します。
3. 患部に長く留まるので、1日1回の使用で効果をあらわします。
4. みずむし・たむしによる皮膚症状(じゅくじゅく、ひびわれ、皮むけ等)を改善します。



## 使用上の注意



**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。  
(2) しっしん。  
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 乳幼児。  
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 患部が顔面または広範囲の人。  
(6) 患部が化膿している人。  
(7) 「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い。)
- (8) 妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、水疱、亀裂、乾燥・つっぱり感、ただれ

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けてください。

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等)

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 使用法

1日1回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布してください。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にしてください。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2～4週間は治療を続けることが大切です。

## 成分・分量


本剤は、白色のクリーム剤で、1g中に次の成分を含有する。

ラノコナゾール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10mg

添加物：セタノール、ステアリルアルコール、セバシン酸ジエチル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルピタン、パラベン、BHT

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03 (6667) 3232  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元  
 **第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元  
**日本農薬株式会社**  
東京都中央区日本橋1-2-5

この説明文書は、本剤とともに保管し、  
使用に際しては必ずお読みください。

みずむし・たむし用薬

# ウインダム<sup>®</sup>液

## ウインダム<sup>®</sup>液の特徴

1. 医療用で使用されている成分「ラノコナゾール」を配合したみずむし・たむし治療薬です。
2. 患部によく浸透し、角質が厚くなってしまったみずむしにも効果を発揮します。
3. 患部に長く留まるので、1日1回の使用で効果をあらわします。
4. みずむし・たむしによる皮膚症状(かさつき、つぶれていない水疱等)を改善します。
5. 塗りやすく使いやすい液剤です。乾燥(表面がかさかさしている)タイプのみずむし・たむしに適しています。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。  
(2) しっしん。  
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 乳幼児。  
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 患部が顔面または広範囲の人。  
(6) 患部が化膿している人。  
(7) 「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがかはつきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い。)
- (8) 妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、水疱、亀裂、乾燥・つっぱり感、ただれ

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けてください。

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等)

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 使用法

1日1回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。


患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布してください。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にしてください。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなっても2～4週間は治療を続けることが大切です。

## プッシュ式容器の使い方

### 使用前

温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合、容器の中の圧力が高くなり薬液が多く出ることがありますので、使用前に容器の先端を上に向けて、手の指で先端部分を押し、中の空気を抜いてください。


押す




### 使用中

使用する際は、容器の先端を下に向け、患部に軽く押しあてて塗布してください。先端を押したままにすると、薬液が出続けますのでご注意ください。

押す  
(薬液が出る)



はなす  
(薬液が止まる)



## 成分・分量

本剤は、無色透明な液剤で、1mL中に次の成分を含有する。

ラノコナゾール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10mg

添加物:マクロゴール、メチルエチルケトン、エタノール

本剤にはアルコールが含まれていますので、塗布時にしみる場合があります。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かすことがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください。
- (7) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03 (6667) 3232  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元  
**日本農薬株式会社**  
東京都中央区日本橋1-2-5

この説明文書は、本剤とともに保管し、  
使用に際しては必ずお読みください。

みずむし・たむし用薬

**ウィンダム** 軟膏

### ウィンダム®軟膏の特徴

1. 医療用で使用されている成分「ラノコナゾール」を配合したみずむし・たむし治療薬です。
2. 患部によく浸透し、角質が厚くなってしまったみずむしにも効果を発揮します。
3. 患部に長く留まるので、1日1回の使用で効果をあらわします。
4. みずむし・たむしによる皮膚症状(じゅくじゅく、ひびわれ、皮むけ等)を改善します。



### 使用上の注意



**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。  
(2) しっしん。  
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 乳幼児。  
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 患部が顔面または広範囲の人。  
(6) 患部が化膿している人。  
(7) 「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い。)
- (8) 妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、水疱、亀裂、乾燥・つっぱり感、ただれ

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けてください。

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等)

### 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 使用法

1日1回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、使用後、症状がかえって悪化した場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布してください。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔になりやすいので特に清潔にしてください。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2～4週間は治療を続けることが大切です。


## 成分・分量

本剤は、白色の軟膏剤で、1g中に次の成分を含有する。

ラノコナゾール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10mg  
添加物:ワセリン

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03 (6667) 3232  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元  
 **第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元  
**日本農薬株式会社**  
東京都中央区日本橋1-2-5