

## 使用上の注意

### 【X】してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

#### ① 次の人は使用しないでください

- 未成年者(20歳未満)。  
国内での使用経験がありません。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。  
妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。
- 妊娠、出産に伴い脱毛している人。  
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
- 過往に本剤の使用をやめたことにより脱毛している人。  
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、過激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。  
本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。
- 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。  
男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

- 脱毛が急速であったり、髪が膜状に抜けている人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。

- 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。

#### ② 男性。

男性の方は「リアップ」をご使用ください。

#### ③ 次の部位には使用しないでください

- 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。  
血圧が下がる等のおそれがあります。

- せず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮、  
舌等を悪化させることができます。

- 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。  
これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

## 相談すること

### ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- ① 家族、兄弟姉妹に社年性脱毛症の人がない人。  
社年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。
- ② 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことのある人。
- ③ 高齢者(65歳以上)。  
国内での使用経験がほとんどありません。
- ④ 高血压の人、妊娠の人。  
本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。
- ⑤ 心臓又は腎臓に障害のある人。  
本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。
- ⑥ 次の診断を受けている人。  
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)、甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。
- ⑦ むくみのある人。  
むくみを増強させる可能性が考えられます。

### ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 脊	頭皮の発赤・発赤・かゆみ・かぶれ、かげ、局所熱感等
神 経 系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器系	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない複数の体調増加、手足のむくみ

### ③ 6ヶ月使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程履、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、社年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

### ④ 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、社年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

## その他の注意

- ① 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。
- ② 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
- ③ 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。本剤は社年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。